

# INFORMACIJA O CEPLJENJU PROTI OKUŽBI S HPV IN IZJAVA

## 1. KAJ JE HPV?

Okužba s humanimi papilomavirusi (HPV) je ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb v svetu in tudi v Sloveniji.

**Vsaj polovica ljudi, ki so spolno aktivni, se v življenju okuži s HPV.**

Okužene osebe večinoma nimajo bolezenskih znakov. Pri večini okužba spontano mine, pri nekaterih pa se lahko razvije trajna okužba s HPV. Po trajni okužbi z visokorizičnimi genotipi se lahko pojavi rak materničnega vratu in nekateri drugi raki, po okužbi z nizkorizičnimi genotipi pa genitalne bradavice. Zdravljenje bolezni, ki nastanejo kot posledica teh okužb (predrakave spremembe materničnega vratu, rak materničnega vratu, genitalne bradavice...) je dolgotrajno in ni vedno uspešno.

**Rak materničnega vratu ne more nastati brez trajne okužbe z enim izmed visokorizičnih genotipov HPV.**

V Sloveniji je rak materničnega vratu še vedno pomemben javno-zdravstveni problem, kljub zelo učinkovitemu državnemu programu zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (ZORA).

**Po podatkih Registra raka, ki ga vodijo na Onkološkem inštitutu je zadnja leta za rakom materničnega vratu vsako leto na novo zbolelo okrog 130 žensk, 30 do 40 pa jih je zaradi te bolezni umrlo.**

## 2. CEPIVO PROTI OKUŽBI S HPV - ZAKAJ JE POMEMBNO?

Cepiva, ki so v Sloveniji na voljo za cepljenje proti okužbi s HPV so inaktivirana (mrtva) cepiva, ki zelo učinkovito preprečijo okužbo z najpogostejšimi visokorizičnimi genotipi, ki povzročajo raka materničnega vratu in nekatere druge rake. Dve izmed cepiv ščitita tudi proti genitalnim bradavicam.

**Pričakuje se, da bo zaščita po cepljenju dolgotrajna.**

Velja pa opozorilo, da bodo tako pri cepljenih kot pri necepljenih deklicah tudi v prihodnosti vseeno potrebni redni ginekološki pregledi in odvzemi brisov materničnega vratu, saj cepljenje ne ščiti pred vsemi genotipi HPV, ki lahko povzročajo predrakave spremembe in raka materničnega vratu.

OBRNITE →



## Izjava o cepljenju proti okužbi s HPV

(se hrani v zdravstvenem kartonu)

Spodaj podpisani \_\_\_\_\_, zakoniti zastopnik deklice:

Ime in priimek \_\_\_\_\_, rojene \_\_\_\_\_

**SOGLAŠAM s cepljenjem**

**NE SOGLAŠAM s cepljenjem**

(ustrezno obkroži)

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

V kolikor soglašate s cepljenjem Vaše deklice proti HPV vas prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja:

Ali vaša deklica trenutno preboleva kakšno bolezen? Katero?

NE DA \_\_\_\_\_

Ali jemlje kakšna zdravila? Katera?

NE DA \_\_\_\_\_

Ali je imela kdaj hujšo alergijo na hrano? Na katero?

NE DA \_\_\_\_\_

Ali je imela kdaj hujšo alergijo na zdravila? Na katera?

NE DA \_\_\_\_\_

Ali je imela kdaj hujšo reakcijo po cepljenju? Po katerem?

NE DA \_\_\_\_\_

Ali nam želite še kaj sporočiti?

NE DA \_\_\_\_\_

### 3. KAKO SE CEPI PROTI OKUŽBI S HPV IN KDAJ?

Cepljenje proti okužbi s HPV se izvaja ob sistematičnem pregledu, ko deklice, ki obiskujejo 6. razred osnovne šole (ali zamudnice v 8. razredu), prejmejo prvi odmerek cepiva. Zadnje raziskave kažejo, da sta za zaščito pri tej starosti dovolj dva odmerka cepiva, prejeta s presledkom najmanj 6 mesecev.

Drugi odmerek deklice prejmejo po dogovoru s šolskim zdravnikom. Dodatni poživitveni odmerki cepiva zaenkrat niso predvideni. Cepljenje proti okužbi s HPV se lahko opravi istočasno z drugimi cepljenji.

***Cepljenje je najbolj učinkovito pred morebitno izpostavljenostjo okužbi s HPV, torej pred prvimi spolnimi stiki. Cepivo ne zdravi že obstoječe okužbe s HPV in njenih zapletov.***

### 4. KDAJ SE NE SME CEPITI PROTI OKUŽBI S HPV?

Proti okužbi s HPV se ne sme cepiti, če je deklica kdaj imela hudo alergično reakcijo na sestavine cepiva ali če je imela resen neželen učinek po predhodnem odmerku istega cepiva.

Cepljenje s cepivom proti okužbi s HPV je treba odložiti pri deklicah, ki imajo hujšo akutno bolezen z zvišano telesno temperaturo.

### 5. ALI JE CEPIVO PROTI OKUŽBI S HPV VARNO?

Kot pri vseh drugih cepljenjih se lahko tudi po cepljenju proti HPV pojavijo neželeni učinki, ki pa so običajno blagi in prehodni. Najpogosteje so to lokalne reakcije na mestu cepljenja (bolečina, rdečina, oteklina) in zvišana telesna temperatura. Resnejši neželeni učinki so zelo redki.

***Po dosedanjih izkušnjah v različnih državah po svetu se je cepivo izkazalo za zelo varno.***

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija po pregledu podatkov o spremljanju neželenih učinkov po uvedbi cepljenja proti HPV v rutinske programe ugotavlja, da je cepivo varno.

Več informacij o cepljenju proti okužbi s HPV lahko dobite pri šolskem zdravniku ali na spletni strani NIJZ: [www.nijz.si](http://www.nijz.si)