

## Priporočila za poekspozicijsko cepljenje proti hepatitisu A

Vsem osebam, starejšim od enega leta, ki so bile izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa A in pred tem niso bile cepljene oz. boleznijo niso prebolele, priporočamo cepljenje z **enim odmerkom cepiva proti hepatitisu A čimprej oz. znotraj 2 tednov po izpostavitvi (1)**.

Izpostavljene osebe, ki naj prejmejo poekspozicijsko cepljenje, so:

- 1. tesni kontakti** oseb s potrjeno okužbo s hepatitisom A
  - osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu,
  - spolni partnerji okužene osebe,
  - osebe, ki so si z okuženim delile pribor za uporabo nedovoljenih drog.
- 2. osebje in otroci v jaslih/vrtcih ter njihovi družinski člani**
  - Cepi se vse predhodno necepljeno osebje in otroke v jaslih kadar:
    - zbolijo najmanj en otrok ali zaposleni v jaslih,
    - se primeri pojavijo v najmanj dveh gospodinjstvih (družinah) otrok, ki obiskujejo iste jasli.
  - V vrtcih, ki jih obiskujejo starejši otroci (brez plenice), je poekspozicijsko cepljenje potrebno le pri osebah, ki so v istem oddeleku kot indeks bolnik. Cepljenje otrok in osebja drugih oddelkov ni potrebno.
  - Ob izbruhu (primeri potrjene okužbe s hepatitisom A v treh ali več družinah, ki imajo majhne otroke v isti ustanovi) je potrebno premisliti o poekspozicijskem cepljenju družinskih članov vseh otrok, ki obiskujejo ustanovo in še nosijo plenice.
- 3. osebe, izpostavljene skupnemu viru okužbe (npr. okuženemu zaposlenemu, ki pripravlja in rokuje s hrano)**

Kadar je okužba potrjena pri enem izmed zaposlenih, ki pripravlja in rokuje s hrano, je poekspozicijsko cepljenje indicirano pri vseh ostalih zaposlenih v istem obratu in glede na okoliščine tudi pri tistih, ki so uživali to hrano.

Kadar gre za **primer hepatitisa A** v šoli (ki jo obiskujejo le otroci, ki ne nosijo več plenice), bolnišnici ali delovni organizaciji in je **vir okužbe potrjen izven ustanove**, rutinska poekspozicijska profilaksa ni smiselna. Prav tako je ne priporočamo rutinsko pri osebju, ki v bolnišnici oskrbuje bolnika s potrjenim hepatitisom A. V teh primerih je potrebno poskrbeti za izvajanje strogih higienskih ukrepov.

Če pa je potrjeno, da se je **okužba širila med učenci ali zaposlenimi na šoli ali med pacienti in osebjem bolnišnice**, je poekspozicijsko cepljenje indicirano le pri necepljenih tesnih kontaktih (1).

Za poekspozicijsko cepljenje imamo v Sloveniji na voljo cepivo Havrix<sup>®</sup>, proizvajalca GlaxoSmithKline, in sicer: **Havrix<sup>®</sup> 720** za otroke, stare od 1 do vključno 15 let ter **Havrix<sup>®</sup> 1440** za odrasle (2).

Za osebe, ki potrebujejo dolgotrajno zaščito proti hepatitisu A (npr. zaradi potovanj) je smiselno, da se cepijo še z enim odmerkom cepiva (samoplačniško) 6 do 12 mesecev po prvem.

Viri:

1. CDC: Hepatitis A Information for Health Professionals. Pridobljeno 11.06.2013 s spletne strani: <http://www.cdc.gov/hepatitis/HAV/HAVfaq.htm#B3>
2. IVZ RS: Cepiva proti hepatitisu tipa A. Pridobljeno 11.6.2013 s spletne strani: [http://www.ivz.si/cepljenje/splosna\\_javnost/informacije\\_o\\_cepivih?pi=18&\\_18\\_view=item&\\_18\\_newsId=2096&pl=266-18.0](http://www.ivz.si/cepljenje/splosna_javnost/informacije_o_cepivih?pi=18&_18_view=item&_18_newsId=2096&pl=266-18.0)