



Raba antibiotikov v: ustanovah za dolgotrajno oskrbo v Evropi



1 / 20

oskrbovancev vsak dan prejme
vsaj en antibiotik.



7 / 10

antibiotikov

je bilo predpisanih za zdravljenje okužbe
in 3 izmed 10 za protimikrobno zaščito
(profilakso).



3 / 4 profilaks

je bilo predpisanih za preprečevanje okužb sečil. Čeprav to lahko zmanjša
tveganje za okužbo sečil pri ženskah, pa ni dokazov o učinkovitosti
profilakse pri široki rabi pri starejših bolnikih.

Poleg tega je predpisovanje profilakse povezano s povečano protimikrob-
no odpornostjo. Večina profilaks lahko zato predstavlja nepotrebno rabo
antibiotikov.

Rešitve


Preudarna raba antibiotikov v ustanovah za zdravstveno oskrbo je bistvenega pomena za boj proti
protimikrobni odpornosti. V bolnišnicah in ustanovah za dolgotrajno oskrbo se lahko sprejmejo naslednji ukrepi:



Izogibajte se dolgotrajni in
nepotrebni antibiotični profilaksi.



Uporabljajte antibiotike ozkega
spektra, kadar je to mogoče.



Izvedite časovno ustrezno parenteralno-
oralno zamenjavo načina aplikacije
antibiotika, kadar je to mogoče.



Vedno dokumentirajte indikacijo za antibiotično
zdravljenje, izbiro antibiotika, odmerke, način aplikacije
in trajanje zdravljenja v bolnikov zdravstveni karton.



Izvajajte programe nadzorovane
rabe antibiotikov.