

## Statistika smrti zaradi prepovedanih drog


V letu 2017 smo v Sloveniji beležili 47 neposrednih smrti, povezanih z uporabo prepovedanih drog, kar je 7 smrti več kot v letu 2016. V obdobju od leta 2013 beležimo trend naraščanja števila umrlih. Večina smrti se zgodi v domačem okolju. Med umrlimi vsa leta prevladuje delež moških. Leta 2017 je bilo med umrlimi 37 moških in 10 žensk. Povprečna starost moških je bila 39.5 let, povprečna starost žensk pa 44.6 let. Spremljanje podatkov v obdobju zadnjih desetih let kaže na to, da odvisniki umirajo vse starejši. Ob tem je treba omeniti, da tudi v Sloveniji uporabniki že uporabljajo fentanil, zaznani sta bili dve smrti zaradi fentanila. Leta 2018 pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal tudi smernice za ravnanje s fentanili za uslužbenca, ki bi prišli v stik s to snovjo.

Toksikološke analize so pokazale, da je v letu 2017 večino smrti povzročila zastrupitev s heroinom (18). Sledijo zastrupitve s kokainom (14), ki so zelo porasle že v letu 2016. V opazovanem letu je bilo zabeleženih kar sedem smrti zaradi drugih sintetičnih opioidov (zdravilo za zdravljenje bolečine: Tramadol), od tega pet pri ženskah v starostni skupini nad 45 let.


Glavni pristopi za zmanjševanje števila smrti zaradi predoziranja z opiodi, ki jih izvajamo v Sloveniji in jih lahko predstavljamo kot dobro prakso, so dostopno substitucijsko zdravljenje, varno in učinkovito urejanje protibolečinske terapije, dolga tradicija programov „zmanjševanja škode“, Early Warning System – dobra nacionalna in regionalna mreža, prepoznava in zdravljenje pridruženih duševnih bolezni.

V prihodnosti bi bilo pomembno izvajati še naslednje ukrepe: presejanja za predoziranje bi pomenila, da bi lažje identificirali posameznike, ki imajo večje tveganje, prav tako bi bilo pomembno spremljati duševno zdravje uporabnikov, predvsem glede pravočasnih intervencij preprečevanja samomorov med to populacijo. Poleg preventivnih dejavnosti izobraževanja in svetovanja uporabnikom o dejavnikih tveganja za predoziranje, bi bilo potrebno v javnosti potrebno dvigniti zavedanje o dejavnikih tveganja za predoziranje in možnostih za ukrepanje, prvo pomoč in uvesti strukturne ukrepe. Sem spada javnozdravstveni ukrep »nalokson za domov«.


### Neposredne smrti 2013-2017, Slovenija



### Starostna porazdelitev umrlih zaradi prepovedanih drog, neposredne smrti 2016, 2017



### Neposredne smrti 2004-2017, toksikološka porazdelitev



\*\*\*

#### Služba za komuniciranje

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana

Telefon: 01 2441 494, 01 2441 579

[pr@nijz.si](mailto:pr@nijz.si)

[www.nijz.si](http://www.nijz.si)

[Podatkovni portal NIJZ](#)

