

4. 2. 2019

Priporočila za izvajanje rednega cepljenja otrok proti pnevmokoknim okužbam ob zamenjavi 10-valentnega cepiva s 13-valentnim

Ker smo iz Službe za preskrbo s cepivi prejeli obvestilo, da je za izvajanje rednega cepljenja otrok na voljo 13-valentno cepivo proti pnevmokoknim okužbam (Prevenar 13), smo pripravili priporočila za nadaljnje izvajanje cepljenja proti pnevmokoknim okužbam po Programu.

Za izvajanje rednega cepljenja otrok 13-valentno cepivo proti pnevmokoknim okužbam (Prevenar 13) zamenjuje 10-valentno cepivo (Synflorix).

S 13-valentnim cepivom (Prevenar 13) cepimo po enaki shemi kot do sedaj z 10-valentnim cepivom (Synflorix), v skladu s Programom cepljenja, glede na starost ob začetku cepljenja.

Pri otrocih, ki začenjajo s cepljenjem, se cepljenje opravi s 13-valentnim cepivom (Prevenar 13).

Pri otrocih, ki so že prejeli prvi odmerek 10-valentnega cepiva (Synflorix), priporočamo, da se tudi za drugi odmerek uporabi 10-valentno cepivo (če je na voljo, sicer se lahko uporabi 13-valentno cepivo), za poživitveni/tretji odmerek pa se lahko uporabi 13-valentno cepivo (Prevenar 13).

Pri zamudnikih, ki so s cepljenjem pričeli po enem letu starosti in so že prejeli prvi odmerek 10-valentnega cepiva (Synflorix), se za poživitveni/drugi odmerek lahko uporabi 13-valentno cepivo (Prevenar 13).