

KRAJ, DATUM, URA	Ljubljana, 27.10.2021 ob 13:00
NAMEN SESTANKA	sestane Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC)

AGENDA	
1.	Pregled sklepov preteklih sestankov
2.	Tretji odmerek za cepljenje proti covid-19
3.	Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19
4.	Kontraindikacije za cepljenje proti gripi
5.	Razno

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)	
Ad. 1	Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

## KOMENTAR/SKLEP

**Ad 2. Tretji odmerek za cepljenje proti covid-19**

Predstavnica NIJZ seznanila člane PSC s posodobitvami SmPC za cepivo Spikevax (Moderna) – poživitveni odmerek, ki je polovičen (50 mcg), se lahko uporabi vsaj 6 mesecev po drugem odmerku za osebe stare 18 let in več.

Glede na posodobljen SmPC se ustrezno posodobi priporočila za cepljenje proti covid-19 (izjava glede »off label« uporabe ni več potrebna).

V posodobljenih priporočilih naj se posebej poudari (krepko), da se za poživitveni odmerek cepiva Spikevax uporabi polovični odmerek, pa tudi, da je cepljenje s tem cepivom priporočeno za osebe starejše od 30 let.

Predstavnica NIJZ predstavi pregled po tujih državah, kakšna imajo priporočila glede cepljenja s 3. odmerkom.

Člani PSC predlagajo nekatere širitve indikacij glede poživitvenih odmerkov.

Tako bi se poživitveni odmerki priporočali:

- oskrbovancem DSO in drugih SVZ
- osebam starim 50 let in več

- posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost
- družinskim članom imunsko oslabljenih oseb in posebej ranljivih kroničnih bolnikov
- osebam z večjo poklicno izpostavljenostjo
- osebam, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi.

Glede na trenutno epidemiološko situacijo, člani PSC predlagajo, da se poživitveni odmerek za osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi, opravi s presledkom vsaj dveh mesecev.

#### **Ad 3. Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19**

V priporočilih je smiselno tudi pri kontraindikacijah dodati, da se cepljenje z vektorskimi cepivi opravi, kadar obstajajo kontraindikacije za cepljenje z mRNA cepivi.

Na spletni stran pod rubriko Vprašanja & odgovori je potrebno dodati vprašanje in odgovor glede cepljenja po prebolelem miokarditisu.

#### **Ad 4. Kontraindikacije za cepljenje proti gripi**

Predstavnica NIJZ seznanjena z letošnjimi priporočili za cepljenje proti gripi – dodano je bilo poglavje o kontraindikacijah, z navedbo, da se pri osebah z dokazano težjo alergično reakcijo (anafilaksijo) na jajca cepljenje opravi pod zdravniškim nadzorom.

Člani PSC se strinjajo s trenutno dikcijo v priporočilih, vendar predlagajo, da se na spletni stran pod rubriko Vprašanja & odgovori doda vprašanje in odgovor glede tega, kjer se izrecno poudari, da cepljenje pod zdravniškim nadzorom ne pomeni cepljenje v bolnišnici ali v navzočnosti alergologa, pač pa pod nadzorom zdravnika, ambulantno.

ZAKLJUČEK SESTANKA	15:00
--------------------	-------