

Evidenca obravnave uporabnikov drog v letu obravnave 2020

Neprekinjena obravnava



Ljubljana, 2021

Poročilo izdelali:

Nacionalni inštitut za javno zdravje:

Nataša Delfar, Zdravstveno podatkovni center

Mateja Jandl, Center za proučevanje in razvoj zdravja

David Breznikar, Zdravstveno podatkovni center

Tina Anderle, Zdravstveno podatkovni center

Za vsebino poročila so odgovorni avtorji poročila.

Tekst ni lektoriran.

Spletni naslov Nacionalnega inštituta za javno zdravje: <https://www.nijz.si/>

Spletni naslov poročila: <https://www.nijz.si/sl/evidenca-obravnave-uporabnikov-drog/poročilo-TDI-2021-neprekinjena-obravnav>


Kontaktne naslovi:

natasa.delfar@nijz.si

mateja.jandl@nijz.si


Evidenca obravnave uporabnikov drog - NEPREKINJENA OBRAVNAVA je vprašalnik, v katerega se evidentira vsaka oseba (po metodi intervjuja), ki je neprekinjeno v obravnavi v rednem programu obravnave zaradi uživanja prepovedanih drog iz preteklega leta. V neprekinjeni obravnavi za leto obravnave 2020 je bilo 2479 uporabnikov prepovedanih drog.

Slika 1: Število uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi, po Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020


Slika 2: Spol uporabnika prepovedanih drog, ki je neprekinjeno v obravnavi zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

V neprekinjeni obravnavi zdravljenja je bilo v letu 2020 80.8% moških in 19.2% žensk.


Slika 3: Povprečna starost uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi po spolu (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

Uporabniki prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, so bili v povprečju stari 41.68 let. Moški so bili povprečno stari 42.03 let, medtem ko je bila povprečna starost žensk 40.20 let.

Slika 4: Starostne skupine uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, po spolu (%)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

Največ uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je bilo v starosti od 40 do 44 let. Starostna struktura uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi,

je podobna za moške kot za ženske. Med moškimi uporabniki prepovedanih drog je bilo 33.3% uporabnikov v starosti od 40 do 44 let, 25% moških je bilo v starosti od 35 do 39 let, 18.2% moških je bilo v starosti od 45 do 49 let. Medtem, ko je bilo med ženskami 28.8% v starosti od 40 do 44 let, 23.9% žensk je bilo v starosti od 35 do 39 let, 15.3% žensk je bilo v starosti od 45 do 49 let.


Slika 5: Stalno prebivališče v statistični regiji uporabnikov prepovedanih drog, ki so neprekinjeno v obravnavi (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je imelo 27 % stalno prebivališče v Osrednjeslovenski statistični regiji. 14.2% uporabnikov je imelo stalno prebivališče v Obalno - kraški regiji, 12.5% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je imelo stalno prebivališče v Goriški statistični regiji.


Slika 6: Uporaba glavne prepovedane droge oziroma alkohola v zadnjem letu (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

43.24% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili v neprekinjeni obravnavi zdravljenja, so navedli, da so v zadnjem letu uporabljali heroin kot glavno drogo. 32.7% uporabnikov drog je navedlo, da v zadnjem letu niso uporabljali nobene prepovedane droge.


Slika 7: Uporaba **prve** dodatne prepovedane droge v zadnjem letu (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

60.31% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je povedalo, da v zadnjem letu niso uporabljali prve dodatne droge.

Slika 8: Uporaba **druge** dodatne prepovedane droge v zadnjem letu (%)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

82.57% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je navedlo, da v zadnjem letu niso uporabljali druge dodatne droge.

Alkohol je možno registrirati kot eno izmed drog, ki sestavljajo problem odvisnosti, kadarkoli je prisoten v kombinaciji s prepovedanimi drogami. 20 % uporabnikov, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je uporabilo alkohol v zadnjem letu.


Slika 9: Vbrizgavanje droge v zadnjem mesecu(%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

88.5% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, ni vbrizgavalo drogo v zadnjem mesecu.


Slika 10: Status testiranj za anti HIV in anti HCV



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

57.7% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi, je imelo rezultate testiranj za anti HCV starejše od 12 mesecev. 31.8% uporabnikov je imelo negativen rezultat testiranja za anti HCV. 58.2% uporabnikov prepovedanih drog, je imelo rezultate testiranj za anti HIV starejše od 12 mesecev. 36% uporabnikov prepovedanih drog, je imelo negativen rezultat testiranja za anti HIV.

Slika 11: Vrsta obravnave (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2020

87.1% uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili neprekinjeno v obravnavi zdravljenja, je bilo vključenih v dolgotrajni vzdrževalni program (več kot 6 mesecev).