

2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA





2.4.1 BOLEZNI OBTOČIL (BOLEZNI SRCA IN OŽILJA)


Kljub znatnemu upadu v zadnjih desetletjih bolezni obtočil ostajajo najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji, v letu 2021 so predstavljale 33 % vseh smrti (pri ženskah 38 %, pri moških 27 %). Od leta 2009 pri moških bolezni obtočil niso več najpogostejši vzrok smrti, temveč so na 2. mestu, za neoplazmami.

Najpogostejši smrtni bolezni srca sta akutni miokardni infarkt (imenovan tudi srčni infarkt ali srčna kap) in srčna odpoved, medtem ko je med možganskožilnimi boleznimi največ smrti zaradi možganske kapi. Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni obtočil je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja v Sloveniji presegala povprečje EU, vendar se je pri obeh spolih ta razlika zmanjševala in je od leta 2000 na ravni evropskega povprečja.

Najpogostejše bolezni srca so ishemična bolezen srca (vključno z akutnim miokardnim infarktom, AMI), motnje srčnega ritma, srčna odpoved (popuščanje srca) ter bolezni srčnih zaklopk. Med možganskožilnimi (cerebrovaskularnimi) boleznimi je najpogostejša možganska kap

(cerebrovaskularni insult, CVI), ki je lahko posledica motenj dotoka krvi v možgane ali možganske krvavitve. Zelo pogosta bolezen obtočil je tudi hipertenzija (visok krvni tlak), ki je tudi dejavnik tveganja za bolezni obtočil. Znižanje stopnje umrljivosti za boleznimi obtočil je znatno pripomoglo k podaljšanju pričakovane življenjske dobe, kar pripisujemo zmanjšanju nekaterih dejavnikov tveganja, npr. kajenja, preprečevanju akutnih dogodkov (AMI in CVI) z nadzorom vrednosti krvnega tlaka, krvnega sladkorja in krvnih maščob z zdravljenjem in izboljšani tehnologiji zdravljenja in ukrepanja ob akutnih dogodkih. Vendar pa možnosti za nadaljnje zmanjševanje ovira porast nekaterih drugih dejavnikov tveganja, kot sta debelost in sladkorna bolezen.

2.4.1 Slika 1: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni obtočil po spolu, Slovenija in EU, 2000–2019



Viri: WHO European Data Warehouse, <https://dw.euro.who.int>, 3. 11. 2022




BOLEZNI OBTOČIL 2021

7.568 umrlih
35.426 hospitalizacij
152.894 obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti
2.046 oseb vsak dan v povprečju bolniško odsotnih

Bolezni obtočil so najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji.

Predstavljale so **33 %**
vseh smrti



Prezgodnja umrljivost zaradi bolezni obtočil:

516 smrti pred starostjo 65 let ali **15 %** vseh prezgodnjih smrti.

Viri:

Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46)

Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov (BS) (NIJZ 3)

Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64)

Odsotnost z dela zaradi bolezni obtočil narašča, podaljšuje se povprečno trajanje odsotnosti.

Povprečno trajanje ene odsotnosti



Zdravila za bolezni srca in ožilja so najpogosteje predpisana zdravila v Sloveniji - izdanih je bilo 4,7 milijona receptov v vrednosti 85 milijonov evrov.

26 % vseh receptov

14 % celotne vrednosti izdatkov za zdravila

Dejavniki tveganja

Zvišan krvni tlak
Zvišan krvni sladkor
Kajenje
Telesna neaktivnost
Spol, starost

Zvišane maščobe v krvi
Čezmerna telesna teža
Prekomerno pitje
Stres



2.4.1 Tabela 1: **Umrli zaradi boleznih obtočil** po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2021

| Stevilo | | Starostna skupina | | | | | | | SKUPAJ | |
|---|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| | | 0-34 let | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ | | |
| Bolezni obtočil | 100-199 | M | 9 | 21 | 105 | 268 | 632 | 1.035 | 1.116 | 3.186 |
| | | Ž | 3 | 8 | 32 | 70 | 296 | 1.089 | 2.884 | 4.382 |
| Možganskožilne bolezni | 160-169 | M | 3 | 5 | 17 | 44 | 163 | 298 | 247 | 777 |
| | | Ž | 1 | 3 | 9 | 14 | 95 | 322 | 650 | 1.094 |
| Ishemične bolezni srca | 120-125 | M | 2 | 11 | 67 | 158 | 300 | 352 | 252 | 1.142 |
| | | Ž | - | 2 | 16 | 37 | 116 | 221 | 383 | 775 |
| Srčna odpoved | 150 | M | - | - | - | 2 | 16 | 102 | 266 | 386 |
| | | Ž | - | - | 1 | 2 | 11 | 139 | 937 | 1.090 |
| Na 100.000 prebivalcev starostne skupine | | | | | | | | | | |
| Bolezni obtočil | 100-199 | M | 2,3 | 12,8 | 66,9 | 180,4 | 530,9 | 1.847,0 | 6.906,8 | 301,1 |
| | | Ž | - | 5,5 | 22,0 | 47,3 | 228,1 | 1.351,6 | 7.375,4 | 417,8 |
| Možganskožilne bolezni | 160-169 | M | - | 3,1 | 10,8 | 29,6 | 136,9 | 531,8 | 1.528,7 | 73,4 |
| | | Ž | - | 2,1 | 6,2 | 9,5 | 73,2 | 399,6 | 1.662,3 | 104,3 |
| Ishemične bolezni srca | 120-125 | M | - | 6,7 | 42,7 | 106,3 | 252,0 | 628,2 | 1.559,6 | 107,9 |
| | | Ž | - | - | 11,0 | 25,0 | 89,4 | 274,3 | 979,5 | 73,9 |
| Srčna odpoved | 150 | M | - | - | - | 1,3 | 13,4 | 182,0 | 1.646,2 | 36,5 |
| | | Ž | - | - | - | - | 8,5 | 172,5 | 2.396,2 | 103,9 |

Akutni miokardni infarkt ali srčni infarkt (AMI) in cerebrovaskularni insult ali možganska kap (CVI) sta pomembna vzroka prezgodnje umrljivosti (pred 65. letom starosti),

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46)


Za boleznimi obtočil je v letu 2021 umrlo več žensk kot moških, pri obeh spolih je bilo **največ oseb v starostni skupini 85 let in več**. Pri ženskah so bile vzrok predvsem srčna odpoved in možganskožilne bolezni, medtem ko so bile pri moških pogosteje vzrok ishemične bolezni srca.

V starostnih skupinah do 84 let je za boleznimi obtočil umrlo več moških. V primerjavi z letom 2020 je prisotna porast stopnje umrljivosti na 100.000 prebivalcev pri moških 0-34 let (2,3 v 2021 in 1,0 v 2020) ter pri ženskah 35-44 let (5,5 v 2021 in 2,0 v 2020) in 45-54 let (22,0 v 2021 in 17,9 v 2020).



2.4.1 Slika 2: **Umri zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI) po starostnih skupinah - moški, Slovenija, 2000–2021**


na 100.000 prebivalcev starostne skupine



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46)

2.4.1 Slika 3: **Hospitalizacije¹⁾ zaradi bolezni obtočil po spolu, Slovenija 2012–2021**

na 1.000 prebivalcev



Najpogostejši vzroki hospitalizacije zaradi bolezni obtočil:

- ishemične bolezni srca,
- srčna odpoved,
- možganskožilne bolezni in
- motnje srčnega ritma.

¹⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov



2.4.1 Tabela 2: **Hospitalizacije zaradi boleznih obtočil** po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2021

| | | Starostna skupina | | | | | | SKUPAJ | |
|--|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 0-34 let | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | | |
| Število¹⁾ | | | | | | | | | |
| Bolezni obtočil | I00-I99 | M | 722 | 749 | 1.686 | 4.054 | 6.633 | 6.589 | 20.433 |
| | | Ž | 455 | 390 | 742 | 1.845 | 3.629 | 7.932 | 14.993 |
| Ishemične bolezni srca | I20-I25 | M | 32 | 200 | 670 | 1.686 | 2.182 | 1.519 | 6.289 |
| | | Ž | 6 | 59 | 178 | 616 | 1.007 | 1.185 | 3.051 |
| Srčna odpoved | I50 | M | 15 | 21 | 69 | 273 | 728 | 1.505 | 2.611 |
| | | Ž | 3 | 5 | 19 | 91 | 369 | 2.293 | 2.780 |
| Možganskožilne bolezni | I60-I69 | M | 37 | 69 | 169 | 416 | 822 | 905 | 2.418 |
| | | Ž | 25 | 47 | 91 | 227 | 530 | 1.314 | 2.234 |
| Motnje srčnega ritma | I44-I49 | M | 117 | 104 | 214 | 434 | 731 | 848 | 2.448 |
| | | Ž | 95 | 42 | 82 | 192 | 484 | 825 | 1.720 |
| Na 1.000 prebivalcev starostne skupine²⁾ | | | | | | | | | |
| Bolezni obtočil | I00-I99 | M | 1,8 | 4,4 | 10,5 | 27,0 | 55,4 | 91,0 | 19,1 |
| | | Ž | 1,2 | 2,7 | 5,1 | 12,4 | 27,8 | 66,1 | 14,2 |
| Ishemične bolezni srca | I20-I25 | M | 0,1 | 1,2 | 4,1 | 11,2 | 18,2 | 21,0 | 5,9 |
| | | Ž | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 4,1 | 7,7 | 9,9 | 2,9 |
| Srčna odpoved | I50 | M | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 20,8 | 2,5 |
| | | Ž | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 2,8 | 19,1 | 2,6 |
| Možganskožilne bolezni | I60-I69 | M | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 2,8 | 6,9 | 12,5 | 2,3 |
| | | Ž | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 4,0 | 10,9 | 2,1 |
| Motnje srčnega ritma | I44-I49 | M | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 2,9 | 6,1 | 11,7 | 2,3 |
| | | Ž | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 3,7 | 6,9 | 1,6 |

¹⁾ Vključno s tujci.

²⁾ Brez tujcev.


Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov




2.4.1 Slika 4: **Obiski v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu zaradi bolezni obtočil** po spolu, Slovenija, 2012–2021

na 1.000 prebivalcev

**Zunajbolnišnične obravnave -
 specialistična ambulantna dejavnost**



**Zunajbolnišnične obravnave -
 primarna raven¹⁾**



¹⁾ Ne vključuje patronažne dejavnosti.

Viri:
 Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov
 Podatki zunajbolnišnične zdravstvene statistike (ZUBSTAT) (NIJZ 2)

Najpogostejši razlogi za ambulantni obisk

tako v specialistični zunajbolnišnični obravnavi kot na primarni ravni:

- hipertenzivne bolezni,
- bolezni perifernih žil in
- motnje srčnega ritma.



2.4.1 Tabela 3: **Obiski v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu zaradi bolezni obtočil** po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2021

na 1.000 prebivalcev starostne skupine

| | | | Starostna skupina | | | | | | SKUPAJ |
|--|----------------|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | 0-29 let | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-64 | 65+ | |
| Specialistična ambulantna dejavnost | | | | | | | | | |
| Bolezni obtočil | I00-I99 | M | 8,5 | 21,5 | 39,9 | 77,2 | 119,4 | 223,9 | 71,6 |
| | | Ž | 7,7 | 28,8 | 42,6 | 67,5 | 95,4 | 191,6 | 73,5 |
| Hipertenzivne bolezni | I10, I11, I13 | M | 1,4 | 3,2 | 7,4 | 14,9 | 23,4 | 33,6 | 11,8 |
| | | Ž | 0,8 | 2,4 | 5,7 | 14,2 | 22,8 | 39,5 | 14,3 |
| Bolezni perifernih žil | I70, I80, I83 | M | 0,7 | 3,5 | 7,2 | 12,7 | 20,0 | 30,8 | 10,6 |
| | | Ž | 1,0 | 10,6 | 14,0 | 18,9 | 23,8 | 33,6 | 15,9 |
| Motnje srčnega ritma | I44-I49 | M | 1,1 | 2,2 | 4,1 | 9,5 | 17,2 | 44,4 | 11,9 |
| | | Ž | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 6,5 | 10,9 | 36,2 | 11,4 |
| Primarna raven¹⁾ | | | | | | | | | |
| Bolezni obtočil | I00-I99 | M | 9,1 | 30,2 | 63,1 | 127,7 | 189,6 | 305,0 | 103,4 |
| | | Ž | 9,2 | 34,2 | 60,6 | 109,3 | 159,7 | 311,8 | 116,1 |
| Hipertenzivne bolezni | I10, I11, I13 | M | 2,6 | 12,6 | 35,1 | 74,7 | 108,3 | 135,1 | 50,7 |
| | | Ž | 1,2 | 7,5 | 25,6 | 64,4 | 100,4 | 157,1 | 58,3 |
| Bolezni perifernih žil | I70, I80, I83 | M | 0,6 | 3,7 | 7,1 | 12,4 | 18,3 | 30,5 | 10,4 |
| | | Ž | 1,4 | 10,2 | 13,7 | 18,5 | 21,6 | 37,9 | 16,7 |
| Motnje srčnega ritma | I44-I49 | M | 0,9 | 2,1 | 3,7 | 8,5 | 16,2 | 39,1 | 10,6 |
| | | Ž | 1,1 | 2,4 | 3,8 | 5,5 | 9,9 | 34,5 | 10,8 |

¹⁾ Ne vključuje patronažne dejavnosti.

Viri: Podatki zunajbolnišnične zdravstvene statistike (ZUBSTAT) (NIJZ 2)



2.4.1 Tabela 4: **Delež prebivalcev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ po spolu, starosti, izobrazbi in indeksu telesne mase, Slovenija, 2008, 2012, 2016, 2020**

| | Zvišan krvni tlak | | | | Zvišane maščobe v krvi | | | | Prebolela srčna kap | | | | Srčno popuščanje | | | | Možganska kap | | | | % |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | |
| Spol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moški | 27,4 | 28,6 | 28,4 | 27,3 | 23,4 | 25,7 | 27,4 | 30,0 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | |
| Zenske | 22,7 | 22,7 | 21,9 | 20,6 | 21,4 | 23,5 | 24,6 | 26,7 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | |
| SKUPAJ | 25,1 | 25,7 | 25,2 | 24,0 | 22,4 | 24,6 | 26,0 | 28,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | |
| Starostna skupina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25-34 let | 5,2 | 6,1 | 6,0 | 4,4 | 4,0 | 5,3 | 8,2 | 7,9 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | |
| 35-44 | 11,5 | 11,7 | 12,5 | 9,3 | 14,2 | 15,0 | 18,2 | 17,7 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
| 45-54 | 26,9 | 25,4 | 21,9 | 21,5 | 28,2 | 30,0 | 29,5 | 29,7 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | |
| 55-64 | 43,7 | 44,0 | 41,2 | 37,7 | 38,1 | 39,4 | 40,2 | 43,3 | 3,6 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | |
| 65-74 | 52,2 | 52,4 | 51,8 | 51,4 | 35,6 | 39,8 | 36,1 | 44,9 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 5,9 | 11,1 | 11,7 | 10,8 | 12,7 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 5,0 | |
| Izobrazba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osnovna šola ali manj | 37,3 | 40,2 | 41,1 | 39,9 | 26,9 | 29,5 | 30,5 | 37,5 | 3,6 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 7,2 | 7,6 | 6,5 | 9,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,7 | |
| Poklicna šola | 29,9 | 31,4 | 34,2 | 34,6 | 25,9 | 26,3 | 31,0 | 33,6 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 5,4 | 5,6 | 1,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | |
| Srednja šola | 21,7 | 24,1 | 25,2 | 25,6 | 20,3 | 25,0 | 25,9 | 29,0 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 3,5 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | |
| Višja šola ali več | 16,5 | 17,1 | 15,1 | 14,7 | 17,5 | 21,1 | 21,8 | 23,7 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | |
| ITM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,5-24,9 | 12,7 | 13,7 | 12,7 | 11,0 | 14,7 | 16,8 | 18,5 | 19,5 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
| 25-29,9 | 28,8 | 29,6 | 29,3 | 27,3 | 26,4 | 29,0 | 29,5 | 32,6 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | |
| 30 ali več | 45,5 | 45,8 | 43,6 | 42,5 | 29,9 | 32,9 | 33,8 | 36,1 | 2,7 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 6,4 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | |


¹⁾ Bolezni, ki jih je ugotovil zdravnik (samoporočanje).

Viri: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog (CINDI), 2008, 2012, 2016, 2020

O ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil pogosteje poročajo: **moški** kot ženske, **starejši**, **osebe z nižjo stopnjo izobrazbe** in **osebe z višjim indeksom telesne mase**.




2.4.1 Slika 5: Delež prebivalcev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ po spolu, Slovenija, 2008, 2012, 2016, 2020



¹⁾ Bolezni, ki jih je ugotovil zdravnik (samoporočanje).

Viri: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog (CINDI), 2008, 2012, 2016, 2020

2.4.1 Slika 6: Delež anketirancev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ glede na ITM, Slovenija, 2020




¹⁾ Bolezni, ki jih je ugotovil zdravnik (samoporočanje).

Viri: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog (CINDI), 2020

Tveganje za zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, srčno kap, srčno popuščanje in možgansko kap je večje pri osebah z višjim indeksom telesne mase.



2.4.1 Slika 7: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za PDC zaradi boleznih obtočil po spolu, Slovenija, 2012–2021




Viri: Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov (BS) (NIJZ 3)

Bolezni obtočil so pogosteje vzrok nezmožnosti za delo pri moških kot pri ženskah.

Od leta 2012 do leta 2014 se je pogostnost odsotnosti z dela zaradi boleznih obtočil **pri moških** izrazito zmanjšala in ohranjala približno enako raven do leta 2017, odkar stalno narašča.

Pri ženskah je bil v obdobju od 2012 do 2017 prisoten manj izrazit upad, v letu 2018 pa je tudi pri ženskah prišlo do porasta, sicer manj izrazitega kot pri moških, vrednost je nato ostala približno enaka v letih 2019 in 2020. V letu 2021 je vrednost ponovno nekoliko upadla.


Odsotnost z dela zaradi boleznih obtočil narašča s starostjo, saj je tudi stopnja obolevnosti višja pri višjih starostnih skupinah.





REGIONALNE PRIMERJAVE

2.4.1 Slika 8: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti za boleznimi obtočil po statističnih regijah, Slovenija, 2021*



V letu 2021 je bila **SSS umrljivosti za boleznimi obtočil:**

- **najvišja** v pomurski regiji,
- **najnižja** v obalno-kraški regiji.


SSS prezgodnje umrljivosti (pred 65. letom) pa je bila

- **najvišja** v posavski regiji,
- **najnižja** v obalno-kraški regiji.



2.4.1 Slika 9: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti za boleznimi obtočil po statističnih regijah, Slovenija, 2012–2021*

SSS na 100.000 prebivalcev




Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46)

V letu 2021 je opazno splošno zmanjšanje starostno standardizirane stopnje umrljivosti v primerjavi z 2020, razen v posameznih statističnih regijah.



2.4.1 Slika 10: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti za boleznimi obtočil** po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2021



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46)

Starostno standardizirana stopnja umrljivosti za boleznimi obtočil je bila v letu 2021:

najvišja pri MOŠKIH v posavski regiji,
pri ŽENSKAH v zasavski regij,

najnižja pri MOŠKIH v obalno-kraški regiji,
pri ŽENSKAH v gorenjski regij.

Starostno standardizirana stopnja prezgodnje umrljivosti (pred 65. letom) za boleznimi obtočil je bila v letu 2021:

najvišja pri MOŠKIH v posavski regiji,
pri ŽENSKAH v pomurski regij,

najnižja pri MOŠKIH v obalno-kraški regiji,
pri ŽENSKAH v gorenjski regij.



2.4.1 Tabela 5: **Umrli zaradi bolezni obtočil** po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2021

| | | | Pomurska | Podravska | Koroška | Savinjska | Zasavska | Posavska | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska | Primorsko-notranjska | Goriška | Obalno-kraška | SLOVENIJA |
|-------------------------------|----------------|---|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|---------------|-----------|
| Število | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolezni srca in ožilja | I00-I99 | M | 231 | 551 | 119 | 449 | 97 | 158 | 228 | 659 | 280 | 92 | 187 | 135 | 3.186 |
| | | Ž | 294 | 717 | 160 | 563 | 149 | 187 | 289 | 983 | 395 | 131 | 284 | 230 | 4.382 |
| Možganskožilne bolezni | I60-I69 | M | 78 | 135 | 27 | 100 | 22 | 27 | 57 | 162 | 65 | 25 | 50 | 29 | 777 |
| | | Ž | 82 | 180 | 43 | 124 | 35 | 54 | 72 | 238 | 102 | 29 | 73 | 62 | 1.094 |
| Ishemične bolezni srca | I20-I25 | M | 75 | 213 | 38 | 161 | 43 | 49 | 87 | 241 | 98 | 35 | 57 | 45 | 1.142 |
| | | Ž | 46 | 133 | 22 | 103 | 33 | 27 | 56 | 174 | 67 | 23 | 50 | 41 | 775 |
| Srčna odpoved | I50 | M | 31 | 63 | 21 | 57 | 7 | 23 | 22 | 75 | 34 | 7 | 22 | 24 | 386 |
| | | Ž | 77 | 194 | 35 | 154 | 25 | 51 | 80 | 195 | 105 | 39 | 74 | 61 | 1.090 |
| Na 100.000 prebivalcev | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolezni srca in ožilja | I00-I99 | M | 405,4 | 332,7 | 332,8 | 342,6 | 341,2 | 412,6 | 306,6 | 239,3 | 263,9 | 337,2 | 312,5 | 228,6 | 301,1 |
| | | Ž | 510,7 | 442,6 | 458,7 | 441,2 | 523,0 | 499,5 | 404,1 | 351,0 | 374,8 | 504,4 | 485,3 | 386,9 | 417,8 |
| Možganskožilne bolezni | I60-I69 | M | 136,9 | 81,5 | 75,5 | 76,3 | 77,4 | 70,5 | 76,7 | 58,8 | 61,3 | 91,6 | 83,6 | 49,1 | 73,4 |
| | | Ž | 142,4 | 111,1 | 123,3 | 97,2 | 122,9 | 144,3 | 100,7 | 85,0 | 96,8 | 111,7 | 124,8 | 104,3 | 104,3 |
| Ishemične bolezni srca | I20-I25 | M | 131,6 | 128,6 | 106,3 | 122,8 | 151,3 | 127,9 | 117,0 | 87,5 | 92,4 | 128,3 | 95,3 | 76,2 | 107,9 |
| | | Ž | 79,9 | 82,1 | 63,1 | 80,7 | 115,8 | 72,1 | 78,3 | 62,1 | 63,6 | 88,6 | 85,4 | 69,0 | 73,9 |
| Srčna odpoved | I50 | M | 54,4 | 38,0 | 58,7 | 43,5 | 24,6 | 60,1 | 29,6 | 27,2 | 32,0 | 25,7 | 36,8 | 40,6 | 36,5 |
| | | Ž | 133,8 | 119,8 | 100,3 | 120,7 | 87,8 | 136,2 | 111,9 | 69,6 | 99,6 | 150,2 | 126,5 | 102,6 | 103,9 |

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46)



2.4.1 Tabela 6: Hospitalizacije zaradi bolezni obtočil po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2021

| | | Pomurska | Podravska | Koroška | Savinjska | Zasavska | Posavska | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska | Primorsko-notranjska | Goriška | Obalno-kraška | SLOVENIJA | Tujina | |
|--|----------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|---------------|-----------|--------|-----|
| Število¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolezni srca in ožilja | I00-I99 | M | 1.285 | 2.855 | 903 | 2.659 | 672 | 874 | 1.469 | 4.304 | 1.936 | 546 | 1.427 | 1.315 | 20.245 | 188 |
| | | Ž | 903 | 2.203 | 642 | 1.887 | 485 | 648 | 1.010 | 3.243 | 1.427 | 341 | 1.144 | 982 | 14.915 | 78 |
| Ishemične bolezni srca | I20-I25 | M | 366 | 786 | 233 | 753 | 237 | 273 | 508 | 1.437 | 589 | 187 | 380 | 467 | 6.216 | 73 |
| | | Ž | 136 | 398 | 80 | 323 | 107 | 125 | 226 | 839 | 292 | 74 | 157 | 271 | 3.028 | 23 |
| Srčna odpoved | I50 | M | 216 | 367 | 131 | 388 | 89 | 141 | 172 | 401 | 244 | 52 | 221 | 174 | 2.596 | 15 |
| | | Ž | 185 | 452 | 100 | 378 | 107 | 171 | 187 | 432 | 260 | 66 | 247 | 183 | 2.768 | 12 |
| Možganskožilne bolezni | I60-I69 | M | 180 | 398 | 102 | 334 | 65 | 102 | 171 | 494 | 215 | 38 | 159 | 139 | 2.397 | 21 |
| | | Ž | 153 | 401 | 96 | 289 | 59 | 85 | 136 | 426 | 186 | 52 | 205 | 129 | 2.217 | 17 |
| Motnje srčnega ritma | I44-I49 | M | 152 | 352 | 82 | 281 | 61 | 96 | 208 | 562 | 246 | 71 | 175 | 142 | 2.428 | 20 |
| | | Ž | 132 | 250 | 65 | 214 | 39 | 50 | 147 | 378 | 187 | 29 | 130 | 95 | 1.716 | 4 |
| Na 1.000 prebivalcev²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolezni srca in ožilja | I00-I99 | M | 22,6 | 17,2 | 25,3 | 20,3 | 23,6 | 22,8 | 19,8 | 15,6 | 18,2 | 20,0 | 23,8 | 22,3 | 19,1 | |
| | | Ž | 15,7 | 13,6 | 18,4 | 14,8 | 17,0 | 17,3 | 14,1 | 11,6 | 13,5 | 13,1 | 19,5 | 16,5 | 14,2 | |
| Ishemične bolezni srca | I20-I25 | M | 6,4 | 4,7 | 6,5 | 5,7 | 8,3 | 7,1 | 6,8 | 5,2 | 5,6 | 6,9 | 6,4 | 7,9 | 5,9 | |
| | | Ž | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 4,6 | 2,9 | |
| Srčna odpoved | I50 | M | 3,8 | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 1,9 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | |
| | | Ž | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 3,1 | 2,6 | |
| Možganskožilne bolezni | I60-I69 | M | 3,2 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | |
| | | Ž | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 2,1 | |
| Motnje srčnega ritma | I44-I49 | M | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | |
| | | Ž | 2,3 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | |

¹⁾ Vključno s tujci

²⁾ Brez tujcev.

Viri: Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi vseh vzrokov



2.4.1 Tabela 7: **Obiski v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu¹⁾ zaradi bolezni obtočil po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2021**

| na 1.000 prebivalcev | | Pomurska | Podravska | Koroška | Savinjska | Zasavska | Posavska | Jugovzhodna Slovenija | Osrednjeslovenska | Gorenjska | Primorsko-kraška | Goriška | Obalno-kraška | SLOVENIJA |
|--|---|----------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------|---------|---------------|-----------|
| Specialistična ambulantna dejavnost | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolezni srca in ožilja I00-I99 | M | 50,7 | 59,3 | 67,1 | 61,6 | 35,9 | 36,7 | 65,4 | 113,2 | 45,4 | 17,6 | 64,7 | 84,3 | 71,6 |
| | Ž | 54,9 | 63,5 | 68,6 | 65,1 | 41,2 | 42,0 | 79,0 | 108,3 | 44,7 | 33,9 | 65,5 | 80,5 | 73,5 |
| Hipertenzivne bolezni I10, I11, I13 | M | 13,7 | 10,1 | 14,0 | 16,8 | 2,0 | 8,7 | 9,5 | 13,0 | 9,9 | 3,3 | 14,7 | 11,7 | 11,8 |
| | Ž | 17,6 | 12,3 | 14,1 | 21,6 | 2,8 | 12,2 | 10,2 | 16,5 | 9,4 | 3,5 | 15,5 | 14,5 | 14,3 |
| Bolezni perifernih žil I70, I80, I83 | M | 4,5 | 11,2 | 14,4 | 4,6 | 9,8 | 3,7 | 16,4 | 14,6 | 4,3 | 11,0 | 10,1 | 16,1 | 10,6 |
| | Ž | 7,3 | 15,8 | 21,9 | 8,0 | 17,2 | 6,4 | 32,1 | 19,5 | 6,4 | 26,9 | 16,1 | 19,1 | 15,9 |
| Motnje srčnega ritma I44-I49 | M | 9,3 | 8,5 | 10,2 | 7,8 | 8,5 | 7,0 | 8,9 | 16,8 | 16,7 | 0,8 | 10,8 | 16,6 | 11,9 |
| | Ž | 9,4 | 9,4 | 10,3 | 8,0 | 6,9 | 7,3 | 8,8 | 15,4 | 16,5 | 1,2 | 8,7 | 14,3 | 11,4 |
| Primarna raven¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolezni srca in ožilja I00-I99 | M | 142,8 | 108,4 | 90,0 | 103,8 | 119,1 | 104,0 | 98,9 | 80,1 | 131,2 | 116,1 | 111,8 | 100,4 | 103,4 |
| | Ž | 169,6 | 123,8 | 113,5 | 121,6 | 126,3 | 125,9 | 111,2 | 84,3 | 143,3 | 128,9 | 126,7 | 112,8 | 116,1 |
| Hipertenzivne bolezni I10, I11, I13 | M | 77,0 | 60,9 | 39,4 | 55,5 | 52,7 | 52,7 | 48,9 | 35,9 | 64,7 | 44,3 | 49,0 | 40,8 | 50,7 |
| | Ž | 91,2 | 72,0 | 52,4 | 66,1 | 60,2 | 68,1 | 55,8 | 38,5 | 71,2 | 52,0 | 56,4 | 46,2 | 58,3 |
| Bolezni perifernih žil I70, I80, I83 | M | 13,4 | 11,0 | 12,9 | 10,1 | 14,1 | 7,9 | 8,5 | 8,0 | 11,5 | 13,3 | 10,2 | 14,8 | 10,4 |
| | Ž | 22,1 | 15,5 | 22,6 | 17,2 | 18,5 | 15,1 | 14,8 | 13,3 | 18,9 | 23,7 | 17,7 | 21,1 | 16,7 |
| Motnje srčnega ritma I44-I49 | M | 15,6 | 8,8 | 10,8 | 9,5 | 11,9 | 14,5 | 9,9 | 8,6 | 11,8 | 14,4 | 16,6 | 9,8 | 10,6 |
| | Ž | 16,8 | 9,2 | 12,4 | 10,4 | 10,4 | 14,8 | 10,5 | 8,2 | 12,9 | 14,3 | 15,9 | 9,5 | 10,8 |

¹⁾ Ne vključuje patronažne dejavnosti.

Viri: Podatki zunajbolnišnične zdravstvene statistike (ZUBSTAT) (NIJZ 2)



2.4.1 Tabela 8: *Delež prebivalcev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ in statističnih regijah, Slovenija, 2020*

| Statistična regija | Zvišan krvni tlak | | | | Zvišane maščobe v krvi | | | | Prebolela srčna kap | | | | Srčno popuščanje | | | | Možganska kap | | | | % |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | |
| Pomurska | 25,9 | 27,7 | 27,4 | 30,6 | 20,7 | 19,5 | 25,3 | 30,8 | 0,9 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 6,4 | 1,0 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | |
| Podravska | 26,4 | 27,4 | 26,4 | 26,5 | 22,1 | 24,4 | 26,5 | 30,6 | 2,2 | 1,9 | 1,1 | 2,3 | 4,5 | 3,9 | 3,1 | 3,3 | 1,7 | 2,7 | 0,9 | 2,1 | |
| Koroška | 24,9 | 25,3 | 28,2 | 20,1 | 20,5 | 23,8 | 31,5 | 27,8 | 2,2 | 0,9 | 3,5 | 2,6 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | |
| Savinjska | 28,0 | 25,3 | 28,0 | 22,8 | 23,6 | 25,3 | 27,4 | 26,1 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 5,5 | 4,1 | 5,3 | 5,2 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | |
| Zasavska | 33,6 | 29,0 | 23,2 | 36,1 | 24,4 | 25,7 | 28,0 | 33,9 | 1,6 | 4,0 | 3,3 | 4,8 | 3,6 | 5,9 | 5,1 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | 2,7 | 1,7 | |
| Posavska | 27,6 | 29,7 | 35,5 | 29,2 | 19,0 | 22,5 | 28,1 | 26,3 | 3,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 4,1 | 3,6 | 4,5 | 3,9 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | |
| Jugovzhodna Slovenija | 27,6 | 29,0 | 30,6 | 25,5 | 22,8 | 28,7 | 25,8 | 27,1 | 1,3 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 4,4 | 4,3 | 1,4 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | |
| Osrednjeslovenska | 24,1 | 23,0 | 21,2 | 20,2 | 22,2 | 24,7 | 24,5 | 29,2 | 1,3 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | |
| Gorenjska | 20,5 | 22,9 | 22,5 | 24,2 | 19,8 | 24,1 | 23,3 | 26,9 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | |
| Primorsko-notranjska | 27,4 | 30,8 | 28,4 | 17,4 | 33,2 | 22,5 | 29,5 | 28,5 | 2,6 | 1,2 | 2,9 | 4,1 | 3,1 | 4,0 | 4,8 | 4,2 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | |
| Goriška | 22,6 | 25,6 | 23,8 | 24,8 | 21,2 | 22,2 | 24,6 | 25,8 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | |
| Obalno-kraška | 18,8 | 26,0 | 22,4 | 24,8 | 26,4 | 29,7 | 28,4 | 27,3 | 2,7 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 4,2 | 2,9 | 4,1 | 2,9 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | |
| SLOVENIJA | 25,1 | 25,7 | 25,2 | 24,0 | 22,4 | 24,6 | 26,0 | 28,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | |

¹⁾ Bolezni, ki jih je ugotovil zdravnik (samoporočanje).

Viri: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog (CINDI), 2008, 2012, 2016, 2020



2.4.1 Slika 11: Delež prebivalcev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ po statističnih regijah, Slovenija, 2020



¹⁾ Bolezni, ki jih je ugotovil zdravnik (samoporočanje).

Viri: Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog (CINDI), 2020

Med statističnimi regijami so v letu 2020 anketiranci v najvišjem/najnižjem deležu poročali:

ZVIŠAN KRVNI TLAK

najvišji %

v zasavski regiji

najnižji %

v primorsko-notranjski r.

ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVNI

najvišji %

v zasavski regiji

najnižji %

PREBOLELA SRČNA KAP

najvišji %

v zasavski regiji

najnižji %

v savinjski in goriški regiji

SRČNO POPUŠČANJE

najvišji %

v pomurski regiji

najnižji %

v goriški regiji

MOŽGANSKA KAP

najvišji %


v koroški in pomurski r.

najnižji %

v goriški regiji



2.4.1 Tabela 9: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za PDC zaradi bolezni obtočil po spolu in statističnih regijah delodajalca¹⁾, Slovenija, 2021



© NIJZ


¹⁾ Po statističnih regijah centralne ali lokalne enote delodajalca.

Viri: NIJZ 3 – Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov (BS)



MEDNARODNE PRIMERJAVE

2.4.1 Tabela 10: *Hospitalizacija zaradi bolezni obtočil* po spolu, Slovenija in nekatere države EU, 2020



© NIIZ

Viri: EUROSTAT, <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>, 3. 11. 2022



DEFINICIJE

| OKRAJŠAVA | NAZIV | DEFINICIJA | DODATNA POJASNILA | ANGL. IZRAZ |
|------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| | Bolezni obtočil | Bolezni obtočil so bolezni, ki prizadenejo srce in/ali krvne žile. To so različne bolezni srca, možganskega žilja in perifernih žil, zvišan krvni tlak in drugo. | Imenujemo jih tudi bolezni obtočil, srčno-žilne bolezni ali kardiovaskularne bolezni. IX. Bolezni obtočil: I00-I99 (MKB-10 klasifikacija) | Cardiovascular diseases |
| AMI | Akutni miokardni infarkt | Akutni miokardni infarkt ali srčni infarkt pomeni nenadno motnjo delovanja srca zaradi prekinjenega dotoka krvi v koronarnih (venčnih) srčnih arterijah. | Imenujemo ga tudi srčna kap. MKB-10 klasifikacija: I21 in I22 | Acute myocardial infarction |
| CVI | Cerebrovaskularni insult | Cerebrovaskularni insult ali možganska kap je nenadna motnja delovanja možganov zaradi nezadostne oskrbe s krvjo. Nastane lahko zaradi motnje dotoka krvi v možgane, običajno zaradi strdka v žili (ishemična možganska kap), ali zaradi krvavitve v možganih (hemoragična možganska kap). | MKB-10 klasifikacija: I61, I63 in I64 | Cerebrovascular insult |
| | Groba stopnja | Groba stopnja je podatek o številu primerov bolezni ali številu umrlih, preračunan na 100.000 oseb opazovane populacije. | | Crude rate |
| | Starostna standardizacija | Starostna standardizacija je tehnika v epidemiologiji in demografiji, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različnimi starostnimi strukturami. | | Age standardization |
| SSS umrljivosti | Starostno standardizirana stopnja umrljivosti | Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (SDR) je metoda direktne standardizacije, kjer se izračun stopnje umrljivosti na 100.000 prebivalcev, razdeljen po petletnih starostnih skupinah, umeri s preračunom na standardno populacijo, kar izniči razlike v populaciji glede starosti prebivalstva posameznih držav/regij/teritorija. Ta postopek omogoči neposredno primerjavo stopenj umrljivosti po posameznih državah, ne glede na razlike v starostni strukturi prebivalstva posamezne države. | Pri izračunu SSS se uporablja Evropska standardna populacija (ESP) . Glede na namen opazovanja sta za standardizacijo podatkov uporabljeni populaciji: - Svetovne zdravstvene organizacije (1976) Več informacij: http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/03/WHO-Standard-Popuation.pdf - evropskega statističnega urada Eurostat-a (2013). Več informacij: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home | Standardized death rate |



| OKRAJŠAVA | NAZIV | DEFINICIJA | DODATNA POJASNILA | ANGL. IZRAZ |
|--------------|--|---|--|-------------------------------|
| BS | Bolniški stalež ali začasna odsotnost z dela | Bolniški stalež ali začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb, nege in drugih zdravstveno upravičenih razlogov se v enakem pomenu opisuje tudi z izrazi absentizem, zdravstveni absentizem, bolniška odsotnost. | Podatki o začasni odsotnosti z dela med prebivalci Slovenije so vodeni v podatkovni zbirki "Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov", in sicer na podlagi "Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela" (obr. BOL/03), ki ga je izdal pooblaščen izvajalec zdravstvenega varstva. Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ | Absenteeism from work |
| IO | Indeks onesposabljanja | Indeks onesposabljanja je število koledarskih dni nezmožnosti za delo na enega zaposlenega delavca v enem letu. | IO = število koledarskih dni nezmožnosti za delo / število zaposlenih | Index of temporary disability |
| PDC | Polni delovni čas | Polni delovni čas šteje 40 delovnih ur na teden, razen kadar je z zakonom ali kolektivno pogodbo določeno drugače. | Po Zakonu o delovnih razmerjih polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo se lahko kot polni delovni čas določi tudi čas, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden. | Full-time employment |
| CINDI | Raziskava Z zdravjem povezan življenjski slog | Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog je bila izvedena med odraslimi prebivalci Slovenije v letih 2001, 2004, 2008, 2012, 2016 in 2020. Njen namen je odkrivanje razširjenosti in medsebojne povezanosti dejavnikov tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih, in sicer glede kadilskih, pivskih, prehranjevalnih in gibalnih navad, pa tudi glede obnašanja v zvezi z varnostjo v cestnem prometu in glede koriščenja nekaterih zdravstvenih storitev. Na osnovi zbranih podatkov bo lažje oblikovati prihodnje programe za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije, podatki pa so v pomoč tudi pri smiselnem načrtovanju preventivnih zdravstvenih aktivnosti. | Vzorčni okvir za pripravo vzorca je predstavljal Centralni register prebivalstva. Vzorec je pripravil Statistični urad Republike Slovenije na podlagi stratificiranega enostavnega slučajnega vzorčnega načrta. V vzorec je bilo vključenih 17.500 prebivalcev Slovenije, ki so bili na dan začetka anketiranja stari od 18 do vključno 74 let. Terenska faza ankete je potekala od 11. maja do konca julija 2020. Končna skupna stopnja odgovora v raziskavi je bila 49,7 %, pri čemer je stopnja odgovora po pošti dosegla 24,9 %, stopnja odgovora po spletu pa 24,8 %. V primerjavi z letom 2016 se je stopnja odzivnosti po spletu pomembno zvišala, in sicer kar za 12,6 %, kar pomeni, da s spletnim načinom anketiranja dosegamo vedno širši del populacije. Pri analizi trendov so bili prebivalci v starosti 18–24 let zaradi primerljivosti s podatki iz let 2008, 2012 in 2016 izključeni. | CINDI Health Monitor Survey |
| ITM | Indeks telesne mase | Indeks telesne mase (ITM) je razmerje med telesno maso in kvadratom telesne višine, ki ga izrazimo v kg/m ² . Stanje hranjenosti pri odraslih se glede na indeks telesne mase deli v naslednje kategorije: do 18,4 podhranjenost, od 18,5 do 24,9 normalna hranjenost, od 25,0 do 29,9 | Pri ocenjevanju čezmerne hranjenosti in debelosti se uporablja indeks telesne mase, ki pa ne odraža dejanskega deleža telesne maščobe. Indeks telesne mase = telesna teža (kg) / telesna višina ² (m ²) | Body mass index (BMI) |



| OKRAJŠAVA | NAZIV | DEFINICIJA | DODATNA POJASNILA | ANGL. IZRAZ |
|-----------|--|---|--|---------------------------------|
| | | čezmerna hranjenost, od 30,0 do 34,9 debelost I. stopnje, od 35,0 do 39,9 debelost II. stopnje, 40,0 in več izredna debelost (III. stopnje). | | |
| | Specialistična ambulantna dejavnost | Specialistična ambulantna dejavnost je zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva. Specialistična ambulantna dejavnost kot nadaljevanje oziroma dopolnitev osnovne zdravstvene dejavnosti obsega poglobljeno diagnostiko, zdravljenje bolezni ali bolezenskih stanj ter izvajanje ambulantne rehabilitacije. | Poglavje vključuje podatke o specialistični ambulantni dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, ki je dostopna z napotnico oz. v nekaterih primerih tudi brez napotnice. Vir podatkov so računalniško podprta poročila zunajbolnišnične zdravstvene statistike (ZUBSTAT). Poročajo javni in zasebni izvajalci specialistične ambulantne dejavnosti. Specialistično ambulantno dejavnost izvajajo bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravilišča in zasebni zdravniki specialisti posameznih strok. Specialistična ambulantna dejavnost je izredno heterogena, v Sloveniji med regijami neenakomerno razvejena in zelo raznoliko organizirana. | Out-patient specialist services |
| BO | Bolnišnična obravnava | Bolnišnična obravnava je skupen izraz za vse obravnave v bolnišnični zdravstveni dejavnosti, od sprejema do odpusta, in pomeni skupek aktivnosti (opazovanje, diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija), ki se nanašajo na zdravstveno oskrbo v stacionarni ustanovi (bolnišnici). Sem sodijo različne vrste bolnišničnih obravnav. | Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ . | Hospital care |
| | Hospitalizacija (obrnava z nočitvijo) | Hospitalizacija je neprekinjena, več kot 24 ur (ali vsaj preko noči) trajajoča obravnava pacienta v posteljni enoti bolnišnice. Začne se s sprejemom, nadaljuje z eno ali več epizodami zdravljenja in zaključí z odpustom. Izjemoma je hospitalizacija krajša kot 24 ur, če je bil pacient že prvi dan hospitalizacije premeščen v drugo bolnišnico ali če je v tem času umrl. | Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ . | Hospitalisation |
| | Zunajbolnišnična obravnava | Zunajbolnišnična obravnava je neprekinjena ambulantna zdravstvena obravnava pacienta (na primarni, sekundarni ali terciarni ravni zdravstvenega varstva), pri kateri izvajalec zagotavlja zdravstvene storitve, a ki ne vključuje nočitve v bolnišnici. | Zunajbolnišnična obravnava lahko poteka v zdravstveni in zobozdravstveni dejavnosti ter v drugih dejavnostih za zdravje (zdravstvena nega, patronažna dejavnost, fizioterapija itd.). | Outpatient care |



SEZNAM SLIK

| | |
|--|----|
| 2.4.1 Slika 1: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi boleznih obtočil po spolu, Slovenija in EU, 2000–2019 | 2 |
| 2.4.1 Slika 2: Umrli zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI) po starostnih skupinah - moški, Slovenija, 2000–2021 | 5 |
| 2.4.1 Slika 3: Hospitalizacije¹⁾ zaradi boleznih obtočil po spolu, Slovenija 2012–2021 | 5 |
| 2.4.1 Slika 4: Obiski v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu zaradi boleznih obtočil po spolu, Slovenija, 2012–2021 | 7 |
| 2.4.1 Slika 5: Delež prebivalcev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ po spolu, Slovenija, 2008, 2012, 2016, 2020 | 10 |
| 2.4.1 Slika 6: Delež anketirancev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ glede na ITM, Slovenija, 2020 .. | 10 |
| 2.4.1 Slika 7: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za PDČ zaradi boleznih obtočil po spolu, Slovenija, 2012–2021 | 11 |
| 2.4.1 Slika 8: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti za boleznimi obtočil po statističnih regijah, Slovenija, 2021 | 12 |
| 2.4.1 Slika 9: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti za boleznimi obtočil po statističnih regijah, Slovenija, 2012–2021 | 13 |
| 2.4.1 Slika 10: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti za boleznimi obtočil po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2021 | 14 |
| 2.4.1 Slika 11: Delež prebivalcev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ po statističnih regijah, Slovenija, 2020 | 19 |

SEZNAM TABEL

| | |
|--|----|
| 2.4.1 Tabela 1: Umrli zaradi boleznih obtočil po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2021 | 4 |
| 2.4.1 Tabela 2: Hospitalizacije zaradi boleznih obtočil po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2021 | 6 |
| 2.4.1 Tabela 3: Obiski v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu zaradi boleznih obtočil po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2021 | 8 |
| 2.4.1 Tabela 4: Delež prebivalcev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ po spolu, starosti, izobrazbi in indeksu telesne mase, Slovenija, 2008, 2012, 2016, 2020 | 9 |
| 2.4.1 Tabela 5: Umrli zaradi boleznih obtočil po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2021 | 15 |
| 2.4.1 Tabela 6: Hospitalizacije zaradi boleznih obtočil po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2021 | 16 |
| 2.4.1 Tabela 7: Obiski v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu¹⁾ zaradi boleznih obtočil po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2021 | 17 |
| 2.4.1 Tabela 8: Delež prebivalcev (25–74 let), ki so poročali o posameznih ugotovljenih dejavnikih tveganja in boleznih obtočil¹⁾ in statističnih regijah, Slovenija, 2020 | 18 |
| 2.4.1 Tabela 9: Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO) za PDČ zaradi boleznih obtočil po spolu in statističnih regijah delodajalca ¹⁾ , Slovenija, 2021 | 20 |
| 2.4.1 Tabela 10: Hospitalizacija zaradi boleznih obtočil po spolu, Slovenija in nekatere države EU, 2020 | 21 |