

SPOLNO PRENOSLJIVE OKUŽBE V SLOVENIJI 2001

PRIJAVLJENI PRIMERI SIFILISA, GONOREJE IN SPOLNO PRENOSLJIVIH KLAMIDIJSKIH OKUŽB

V letu 2001 je bilo na osnovi zakona o nalezljivih boleznih Inštitutu za varovanje zdravja RS prijavljenih skupno 520 primerov spolno prenosljivih okužb, 275 pri moških in 245 pri ženskah. Od tega je bilo 54 primerov gonoreje (2,7/100.000) in 205 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe (10,4/100.000). Poleg tega smo prejeli 9 prijav zgodnjega sifilisa (0,46/100.000) in 17 prijav poznega in neopredeljenega sifilisa. Ostale prijave so primeri genitalnega herpesa (52), genitalnih bradavic (69), nespecifičnega uretritisa (107) in izcedka iz sečnice moškega (7).

Razporeditev prijavljenih primerov spolno prenosljivih okužb (SPO) po diagnozah, glede na regijo bivališča in spol je razvidna iz Tabele 1, razporeditev glede na spol in starostno skupino pa iz Tabele 2.

Tabela 1: *PRIJAVLJENI PRIMERI SPO V LETU 2001 PO REGIJI BIVALIŠČA IN SPOLU*


ZDRAVSTVENA REGIJA	SPOL	ZGODNJI SIFILIS	POZNI SIFILIS	NEOPRED. SIFILIS	GONOREJA	UROGEN. KLAMID.OK.
CELJE	MOŠKI	1	0	0	7	8
	ŽENSKE	0	0	7	0	1
	SKUPAJ	1	0	7	7	9
GORICA	MOŠKI	0	0	0	1	2
	ŽENSKE	0	0	1	0	1
	SKUPAJ	0	0	1	1	3
KOPER	MOŠKI	0	0	1	4	8
	ŽENSKE	0	0	2	0	4
	SKUPAJ	0	0	3	4	12
KRANJ	MOŠKI	0	0	0	2	19
	ŽENSKE	0	0	0	1	91
	SKUPAJ	0	0	0	3	110
LJUBLJANA	MOŠKI	2	0	1	22	36
	ŽENSKE	1	1	1	6	21
	SKUPAJ	3	1	2	28	57
MARIBOR	MOŠKI	1	0	0	4	6
	ŽENSKE	2	0	0	1	5
	SKUPAJ	3	0	0	5	11
MURSKA SOBOTA	MOŠKI	0	0	0	0	0
	ŽENSKE	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	0	0	0	0
NOVO MESTO	MOŠKI	1	0	3	1	2
	ŽENSKE	1	0	0	0	1
	SKUPAJ	2	0	3	1	3
RAVNE	MOŠKI	0	0	0	4	0
	ŽENSKE	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	0	0	4	0
TUJCI	MOŠKI	0	0	0	1	0
	ŽENSKE	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	0	0	0	1	0
SLOVENIJA-SKUPAJ	MOŠKI	5	0	5	46	81
	ŽENSKE	4	1	11	8	124
	SKUPAJ	9	1	16	54	205

Tabela 2: PRIJAVLJENI PRIMERI SPO V LETU 2001 PO SPOLU IN STAROSTNIH SKUPINAH


	SPOL	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 44	45 - 64	65+	<15	SKUPAJ
ZGODNJI SIFILIS A51	MOŠKI	0	0	0	4	1	0	0	0	5
	ŽENSKE	1	1	1	0	1	0	0	0	4
	SKUPAJ	1	1	1	4	2	0	0	0	9
POZNI SIFILIS A52	MOŠKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ŽENSKE	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	SKUPAJ	0	1	0	0	0	0	0	0	1
NEOPR. SIFILIS A53	MOŠKI	0	2	1	0	0	2	0	0	5
	ŽENSKE	0	5	1	4	0	0	1	0	11
	SKUPAJ	0	7	2	4	0	2	1	0	16
GONOREJA A54	MOŠKI	8	10	6	10	7	5	0	0	46
	ŽENSKE	0	4	1	1	1	1	0	0	8
	SKUPAJ	8	14	7	11	8	6	0	0	54
KLAMIDIJSKA OK. A56	MOŠKI	4	16	16	15	10	9	0	11	81
	ŽENSKE	11	44	25	16	18	5	0	5	124
	SKUPAJ	15	60	41	31	28	14	0	16	205

Incidenčne stopnje prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa so se od leta 1975 zmanjševale, v letu 1994 pa so začele naraščati. V letu 1999 se je incidenčna stopnja ponovno znižala na nivo izpred leta 1994 (Slika 1).

Prijavne incidenčne stopnje gonoreje se v zadnjih letih zmanjšujejo, najbolj izrazito v zadnjih 5 letih (Slika 2), vendar ocenjujemo, da ti podatki močno podcenjujejo dejansko incidenčno stopnjo.



Slika 1: *INCIDENČNE STOPNJE ZGODNJEGA SIFILISA V SLOVENIJI, 1986 DO 2001*



Slika 2: *INCIDENČNE STOPNJE GONOREJE V SLOVENIJI, 1990 DO 2001*

Kljub dvakratnemu povečanju števila prijavljenih primerov spolno prenesene klamidijske okužbe v zadnjem letu, v primerjavi s prejšnjim (103), ocenjujemo, da so incidenčne stopnje še vedno močno podcenjene. Tabela 3.

Tabela 3: *PRIJAVLJENI PRIMERI SPOLNO PRENESENE KLAMIDIJSKE OKUŽBE PO STAROSTNI SKUPINI IN SPOLU TER USTREZNE INCIDENČNE STOPNJE, 2001*

STAROSTNA SKUPINA	MOŠKI		ŽENSKE		SKUPAJ	
	ŠT. PRIJAV	ŠT/100.000	ŠT. PRIJAV	ŠT/100.000	ŠT. PRIJAV	ŠT/100.000
<15	11	6,8	5	3,3	16	5,1
15 - 19	4	5,6	11	16,2	15	10,8
20 - 24	16	20,8	44	60,2	60	40,0
25 - 29	16	22,2	25	35,8	41	28,9
30 - 34	15	20,7	16	21,9	31	21,3
35 - 44	10	6,6	18	11,8	28	9,2
45 - 64	9	3,6	5	2,0	14	2,8
65+	0	0,0	0	0	0	0,0
SKUPAJ	81	8,5	124	12,2	205	10,4

Tudi podatki o prijavljenih primerih vseh ostalih spolno prenosljivih okužb gotovo podcenjujejo pojavljanje teh bolezni med prebivalstvom in nikakor niso pokazatelj bremena teh bolezni v populaciji. Odražajo le sporadično prijavljanje posameznih zdravnikov.