

Priporočila za cepljenje proti virusu Sars-Cov-2 pri bolnikih, ki prejemajo antikoagulacijska zdravila

- Antikoagulacijsko zdravljenje ni zadržek za cepljenje.
- Za bolnike, ki prejemajo zaviralce vitamina K (Marevan, Sintrom), velja, da se cepljenje lahko varno izvede, kadar je vrednost INR v terapevtskem območju. Pri bolnikih, pri katerih je zdravljenje sicer dobro urejeno, kontrola INR pred cepljenjem ni potrebna. Cepiva na vrednost INR ne vplivajo, zato kontrola INR po cepljenju ni potrebna.
- Bolniki, ki prejemajo neposredne oralne antikoagulate (Pradaxa, Eliquis, Xarelto) in bodo cepljeni dopoldne, jutranji odmerek zaužijejo po cepljenju. Če bodo cepljeni popoldne, zdravilo vzamejo kot običajno.
- Bolniki, ki prejemajo nizkomolekularne heparine v terapevtskem odmerku (Fragmin, Fraxiparine, Clexane) in bodo cepljeni dopoldne, naj si jutranji odmerek aplicirajo po cepljenju. Če bodo cepljeni popoldne, si zdravilo aplicirajo kot običajno.
- Cepivo se aplicira intramuskularno, zato na mestu cepljenja lahko pride do manjšega hematoma. V izogib hematomu takoj po cepljenju priporočamo izvajanje 5 minutnega pritiska na mestu vboda (brez masiranja).

Pripravili: dr.Tjaša Vižintin Cuderman, dr.med, dr. Nina Vene, dr.med, doc. dr.Gregor Tratar, dr.med., prof. dr.Alenka Mavri, dr.med na KO za žilne bolezni, Interna klinika, UKC Ljubljana, dne 19.3.2021