

Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrletno poročilo, 1. oktober – 31. december 2014

V obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2014 je bilo na osnovi *Zakona o nalezljivih boleznih* (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **312 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), po **156** primerov pri moških in pri ženskah.

Prijavljenih je bilo **67 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe** (42 pri moških, 25 pri ženskah), **11 primerov gonoreje** pri moških, **osem primerov zgodnjega sifilisa** (šest pri moških in dva pri ženskah), **dva primera poznega sifilisa** (po en primer pri moških in pri ženskah) in **en primer neopredeljenega sifilisa** pri moških. Med ostalimi prijavljenimi spolno prenesenimi boleznimi po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo **119 primerov genitalnih bradavic**, **72 primerov nespecifičnega uretritisa** in **32 primerov genitalnega herpesa**.

Od 11 prijavljenih primerov gonoreje pri moških je pet moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih. Pri šestih prijavljenih primerih zgodnjega sifilisa pri moških jih je pet navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so **70 odstotkov** primerov SPO prijavili dermatovenerologi, **24 odstotkov** ginekologi, **štiri odstotke** infektologi, **dva odstotka** mikrobiologi in **dva primera** epidemiologi.

Med prijavljenimi primeri SPO je bilo **deset tujih državljanov** (po dva državljana in državljanki iz Srbije in Črne gore, trije državljani iz Bosne in Hercegovine, ena državljanka iz Hrvaške, ena državljanka iz Ukrajine in en državljan iz Avstralije).

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenci SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj bremena te okužbe med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavnih incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **tabeli 1** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2014. V **tabeli 2** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2014.

Tabela 1: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2014

| | | zgodnji sifilis | | gonoreja | | klamidijska okužba – genitalna | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | št. prij. primerov | št. na 100.000 | št. prij. primerov | št. na 100.000 | št. prij. primerov | št. na 100.000 |
| Celje | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 3,3 |
| | moški | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 6,0 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 4,6 |
| Gorica | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 |
| | moški | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| Koper | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,7 |
| | moški | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 4,1 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 3,4 |
| Kranj | ženski | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 5 | 4,8 |
| | moški | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 |
| | <i>skupaj</i> | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 8 | 3,9 |
| Ljubljana | ženski | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 7 | 2,1 |
| | moški | 2 | 0,6 | 5 | 1,6 | 19 | 6,0 |
| | <i>skupaj</i> | 3 | 0,5 | 5 | 0,8 | 26 | 4,0 |
| Maribor | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,8 |
| | moški | 1 | 0,6 | 2 | 1,3 | 6 | 3,8 |
| | <i>skupaj</i> | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 9 | 2,8 |
| Murska Sobota | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 |
| | moški | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 |
| Novo mesto | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | moški | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
| | <i>skupaj</i> | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 |
| Ravne | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | moški | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,8 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 |
| neznana | ženski | 0 | | 0 | | 0 | |
| | moški | 0 | | 0 | | 0 | |
| | <i>skupaj</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>skupaj (slovenski državljani)</i> | ženski | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 24 | 2,3 |
| | moški | 6 | 0,6 | 11 | 1,1 | 42 | 4,1 |
| | <i>skupaj</i> | 8 | 0,4 | 11 | 0,5 | 66 | 3,2 |
| tujci | ženski | 0 | | 0 | | 1 | |
| | moški | 0 | | 0 | | 0 | |
| | <i>skupaj</i> | 0 | | 0 | | 1 | |
| <i>vsi skupaj</i> | ženski | 2 | | 0 | | 25 | |
| | moški | 6 | | 11 | | 42 | |
| | <i>skupaj</i> | 8 | | 11 | | 67 | |

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 16.03.2015.

Tabela 2: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2014

| | | zgodnji sifilis | | gonoreja | | klamidijska okužba – genitalna | |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | št. prij. primerov | št. na 100.000 | št. prij. primerov | št. na 100.000 | št. prij. primerov | št. na 100.000 |
| <15 | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | moški | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 15-19 | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,2 |
| | moški | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 1 | 2,0 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 |
| 20-24 | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 15,8 |
| | moški | 1 | 1,6 | 3 | 4,9 | 5 | 8,2 |
| | <i>skupaj</i> | 1 | 0,9 | 3 | 2,6 | 14 | 11,9 |
| 25-29 | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 6,0 |
| | moški | 2 | 2,8 | 1 | 1,4 | 15 | 20,7 |
| | <i>skupaj</i> | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 19 | 13,7 |
| 30-34 | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 4,1 |
| | moški | 1 | 1,2 | 3 | 3,7 | 13 | 15,8 |
| | <i>skupaj</i> | 1 | 0,6 | 3 | 1,9 | 16 | 10,2 |
| 35-44 | ženski | 2 | 1,4 | 0 | 0,0 | 6 | 4,2 |
| | moški | 2 | 1,3 | 3 | 1,9 | 4 | 2,6 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 3 | 1,0 | 10 | 3,3 |
| 45-64 | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| | moški | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 1,3 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,8 |
| ≥65 | ženski | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | moški | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | <i>skupaj</i> | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| <i>skupaj</i> | ženski | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 25 | 2,4 |
| | moški | 6 | 0,6 | 11 | 1,1 | 42 | 4,1 |
| | <i>skupaj</i> | 8 | 0,4 | 11 | 0,5 | 67 | 3,3 |

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 16.03.2015.

Izčrpnější podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih deset let so predstavljeni v poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2013« (2), ki je na voljo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS: http://www.ivz.si/hiv_spo.

REFERENCE

- (1) Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/. Ur. l. RS, št. 69/1995.
- (2) Klavs I, Kustec T, Kastelic Z, Kosmač S. *Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2013*. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje RS, 2014.