

CELJSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK JULIJ 2023

V mesecu **juliju 2023** smo iz regije Celje prejeli **232 prijav*** nalezljivih bolezni. Stopnja obolevanja (**7.7/10 000 prebivalcev**) je bila nižja kot julija 2022 in nižja od petletnega povprečja (49.6/10 000 prebivalcev).

Incidenca petletnega povprečje nalezljivih bolezni ni bila presežena v nobeni upravni enoti. Najnižja stopnja obolevnosti nalezljivih bolezni pa je bila zabeležena v **UE Mozirje**.

Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v tem mesecu so bile: **norice, lymska borelioza, kampilobakterioza, streptokokni tonzilitis in drugi bakterijski enterokolitisi**.

*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTAH V JULIJU 2023

	BREŽICE	CELJE	LAŠKO	MOZIRJE	SEVNICA	KONJICE	ŠENTJUR	ŠMARJE	VELENJE	ŽALEC	SKUPAJ	JULIJ 2022	POVPR. 2018- 2022
KAMPILOBAKTERIOZA	2	10	1	1	1	3	1	5	4	2	30	23	22.4
DRUGI BAKT. ENTER.	-	7	1	1	-	2	-	1	6	2	20	13	18.2
ROTAVIROZA	1	1	-	1	1	-	1	-	2	-	7	4	3.4
SALMONELOZA	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	6	2	4.6
NOROVIROZA	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	12	5.4
ŠIGELOZA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0	0.2
NORICE	3	6	2	-	9	-	11	2	-	2	35	35	44.2
STREPT. TONZILITIS	2	14	1	-	2	-	1	1	-	4	25	2	13.0
HERPES ZOSTER	3	2	2	-	-	2	3	-	1	3	16	12	24.4
COVID-19	4	1	1	-	1	-	-	-	2	-	9	5875	1219.4
INF. MONONUKLEOZA	4	2	-	-	1	-	-	-	-	1	8	2	1.8
SEPSA	-	6	1	-	-	1	2	3	1	1	15	4	12.4
ERYSIPEL – ŠEN	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	5	8	11.2
LYMSKA BORELIOZA	5	1	3	-	3	4	1	2	3	10	32	46	97.8
KME	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	3.6
MENING. SEROZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0.8
LEGIONELOZA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	4.8
MIKROSPORIJA	1	1	1	-	-	3	1	-	-	-	7	2	2.2
GARJE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.2
KRIPTOSPORIDIOZA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1.2
LAMBLIOZA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7.8
TOKSOPLAZMOZA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	0.2
OSLOVSKI KAŠELJ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.8
LEPTOSPIROZA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.8
HEMORAG. MRZLICA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0	1.2
SKUPAJ	25	53	19	3	20	19	23	17	24	29	232	6050	1502.0
MORBIDITETA/10 000	10.3	8.2	10.5	1.8	11.0	8.2	11.6	5.3	5.3	7.0	7.7	199.9	49.6

ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale **28.9** % vseh prijavljenih bolezni. Vezano na prijavljive

diagnoze smo zabeležili **30 kampilobakterioz, 20 bakterijskih enterokolitsov, 7 rotavirusov, 6 salmoneloz, 3 noroviroze in šigelozo**.

TRANSMISIVNE BOLEZNI

V mesecu juliju smo zabeležili **32** primerov lymške borelioze, kar je manj kot julija 2022 in manj od petletnega povprečja.

DRUGI AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI

V juliju smo od mrežnih zdravnikov za spremljanje gripe, covid-19 in drugih akutnih okužb dihal prejeli **138 prijav respiratornih okužb** (junij 249).

Od drugih zdravstvenih služb izven mreže smo prejeli še dodatnih **68 prijav respiratornih okužb**, kar je manj kot meseca junija (88).

SEPSE

Prejeli smo **15 prijav sepse**. Povzročitelji so bili *E. coli* (6), *S. aureus* (3), *H. influenzae* (1), bakterija *Pseudomonas* (1), drugi po Gramu negativni mikroorganizmi (1) in streptokok skupine A (1). Dobili smo prijavi dveh drugih opredeljenih seps.

ANTIRABIČNE OBRAVNAVE

V mesecu juliju smo v antirabični ambulanti obravnavali 4 osebe, ki so jih poškodovale živali. Povzročitelji poškodb so bili pes (2), zajec (1) in opica (1). Proti steklini smo cepili 2 osebi (ugriz opice na Tajskem in ugriz psa v Bosni in Hercegovini).

EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

Pred in postekspozicijsko cepljenje proti tetanusu

Ob sanaciji škode, ki je v preteklih dneh prizadela Slovenijo, prihaja do poškodb, ob oskrbi katerih se preveri tudi cepilni status proti tetanusu. Posameznike, ki potrebujejo poživitveno cepljenje proti tetanusu, cepimo z dvovalentnim cepivom proti davici in tetanusu (cepivo Imovax dT Adult).

Razlog, zakaj se priporoča cepljenje s kombiniranim bivalentnim cepivom je v dejstvu, da se tudi v SLO srečujemo s primeri (zaenkrat) še kožne davice pri osebah, ki so identificirane kot migranti in da imunost po cepljenju proti davici z leti izzveneva. Sicer priporočilo za cepljenje odraslih z dvovalentnim cepivom za poživitvene odmerke velja že več kot 20 let.

Dvovalentno cepivo ima enak varnostni profil kot monovalentno, ščiti pa še proti davici. V priporočila za cepljenje proti tetanusu je umeščeno tudi cepljenje s trivalentnim cepivom (cepivo Adacel) s komponento zaščite še proti oslovskemu kašlju, ki je priporočljivo in tudi plačano trenutno samo za nosečnice po 24. tednu, za ostale odrasle pa je samoplačniško.

Prav tako se za predekspozicijsko cepljenje, ki pripada vsakemu odraslemu na 10 let z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, priporoča cepljenje s kombiniranim cepivom Di-Te.