

## Priporočila za cepljenje proti covidu-19 za jesen 2023


Cepljenje s cepivom Comirnaty Omicron XBB.1.5 je priporočljivo za:

- oskrbovance DSO/SVZ;
- posebej ranljive kronične bolnike (od 6 meseca starosti dalje)\*;
- osebe, stare 65 let ali več.

Cepijo se lahko tudi ostali, ki želijo.

Cepljenje proti covidu-19 in proti gripi (tudi proti drugim boleznim) se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom.

### Priporočena cepiva za jesen 2023:

Cepivo		Starostne skupine			Shema cepljenja*
		6m-4 leta	5-11 let	≥ 12 let	
Pfizer, BioNTech	Comirnaty Omicron XBB.1.5 (30 µg/odmerek)			✓	1 odmerek
	Comirnaty Omicron XBB.1.5 (10 µg/odmerek)		✓		1 odmerek
mRNA cepivo	Comirnaty Omicron XBB.1.5 (3 µg/odmerek)	✓			3 odmerki** 

\* Težje imunsko oslabljene osebe lahko prejmejo dodaten odmerek cepiva po presoji specialista (po 6 mesecih).

Priporočen presledek med predhodnim cepljenjem proti covidu-19 in cepljenjem s cepivom Comirnaty Omicron XBB.1.5 je vsaj 6 mesecev (minimalen razmak v skladu z navodili proizvajalca (SmPC) je 3 mesece).

Za osebe, ki so prebolele covid-19, naj se cepljenje opravi vsaj 3 mesece po preboleli bolezni.

\*\* Dojenčki in otroci (od 6. meseca do 4. leta starosti) z zaključenim osnovnim cepljenjem proti covidu-19 ali s predhodno okužbo s SARS-CoV-2 v anamnezi, prejmejo 1 odmerek cepiva.

#### # Posebej ranljivi kronični bolniki (tik pred terapijo ali na določeni terapiji):

1. bolniki s presajenimi organi (tudi pred planirano presaditvijo);
  2. bolniki z določenimi rakavimi obolenji:
    - bolniki, ki so trenutno na kemoterapiji
    - bolniki s pljučnim rakom na radikalni radioterapiji
    - bolniki z rakom krvotvornih organov ne glede na fazo zdravljenja
    - bolniki z rakom na imunoterapiji ali prejemniki zdravljenj s protitelesi
    - bolniki z rakom, ki prejemajo zdravljenje, ki vpliva na imunski sistem, kot so inhibitorji proteinske kinaze ali PARP inhibitorji
    - bolniki po PKMC v zadnjih 6 mesecih ali če še prejemajo imunosupresivna zdravila;
  3. bolniki s hudimi boleznimi pljuč: npr. cistična fibroza, težka astma (vsi, ki imajo kljub maksimalni inhalacijski terapiji in prepoznani zdravljeni komorbidnosti, še vsaj 2 poslabšanja na leto in potrebujejo sistemski steroid in/ali imajo uvedeno biološko terapijo), KOPB (vsi, ki imajo vsaj 2 poslabšanja letno in potrebujejo antibiotično terapijo ali sistemski steroid oz. vsaj enkrat letno hospitalizacijo zaradi poslabšanja), bolniki s pomanjkanjem alfa1antitripsina, bolniki z restriktivnimi boleznimi pljuč s VC < 60 % norme in bolniki z idiopatsko pljučno fibrozo,
  4. bolniki z redkimi boleznimi, ki povečujejo tveganje za okužbo (npr. težke prirojene okvare imunosti);
  5. osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s stanjem, ki povečajo tveganje za okužbo (po IDSA\*\*);
  6. odrasli z Downovim sindromom;
  7. odrasli na dializi ali s kronično ledvično boleznijo 5. stopnje.
  8. osebe z več kroničnimi boleznimi, ki so posebej ranljive.
- \*\* - odrasli bolniki s HIV: CD4 < 200 celic mm<sup>3</sup>, otroci: < 15 % CD4
- vsakodnevno zdravljenje s kortikosterodi: prednisolon ≥20 mg/dan (ali > 2mg/kg/dan za bolnike, ki tehtajo < 10 kg) ali ekvivalent ≥ 14 dni - bolniki na bioloških zdravilih (npr. zaviralec TNF-α, rituksimab)

## Ostala cepiva proti covidu-19, ki so na voljo v Sloveniji

Cepivo 		Uporaba 	Starostne skupine				Sheme cepljenja - presledki <sup>\$</sup>
			6 m-4 leta	5-11 let	12-17 let	≥ 18 let	
<b>Pfizer, BioNTech</b> <i>mRNA cepivo</i>	<b>Comirnaty Original /Omicron BA.4-5 (15/15 µg)</b>	osnovno ali poživitveno cepljenje			✓	✓	1 odmerek
	<b>Comirnaty Original /Omicron BA.4-5 (5/5 µg)</b>	osnovno ali poživitveno cepljenje		✓			1 odmerek
<b>Moderna</b> <i>mRNA cepivo</i>	<b>Spikevax bivalent Original /Omicron BA.4-5<sup>§§</sup></b>	osnovno ali poživitveno cepljenje	✓ 1/2 odm.	✓ 1/2 odm.	✓	✓	1 odmerek <sup>\$\$\$</sup>
<b>Novavax</b> <i>proteinsko cepivo</i>	<b>Nuvaxovid</b>	osnovno cepljenje; poživitveni odmerek <sup>\$</sup>			✓	✓ ✓	2 odmerka 3 tedni 

<sup>\$</sup> Poživitveni odmerek lahko prejmejo osebe, pri katerih je minilo **vsaj 3 mesece** od zadnjega cepljenja ali prebolelega covid-19

<sup>§§</sup> Pri osebah, mlajših od 30 let, je namesto cepiva Spikevax priporočljiva uporaba cepiva Comirnaty ali Nuvaxovid.

<sup>\$\$\$</sup> Dojenčki in otroci (od 6. meseca do 4. leta starosti) predhodno necepljeni proti covidu-19 in brez znane okužbe s SARS-CoV-2 v anamnezi, prejmejo 2 odmerka cepiva (polovični odminki) z vsaj štiri tedenskim razmakom.