

3. SI BËHET VAKSINIMI KUNDËR INFEKSIONEVE ME HPV DHE KUR?

Vaksinimi kundër infeksioneve me HPV kryhet gjatë kontrollit sistematik në klasën e 6-të të shkollës fillore, kur vajzat dhe djemtë marrin dozën e parë të vaksinës. Për mbrojtje në këtë moshë mjaftojnë dy doza të vaksinës, ndërmjet të cilave duhet të kalojnë të paktën 6 muaj. Pritet që vajzat dhe djemtë të ftohen për dozën e dytë. Për momentin nuk janë të parashikuara doza përforcuese shtesë.

Të rinjtë mund të vaksinohen kundër HPV deri në moshën 26 vjeç. Pas moshës 15 vjeçare, për mbrojtje nevojiten tri doza të vaksinës. Vaksinimi kundër infeksioneve me HPV mund të bëhet njëkohësisht me vaksinime të tjera.

Vaksinimi është më efektiv përpara ekspozimit të mundshëm ndaj infeksionit me HPV, pra para kontakteve të para seksuale. Vakcina nuk trajton infeksionet ekzistuese me HPV dhe komplikimet e tyre.

4. KUR NUK DUHET TË VAKSINOHENI KUNDËR INFEKSIONEVE ME HPV?

Nuk duhet të vaksinohen kundër infeksioneve me HPV vajzat dhe djemtë që kanë pasur ndonjëherë një reaksion alergjik të rëndë ndaj përbërësve të vaksinës. Vaksinimi duhet të shtyhet për vajzat dhe djemtë që kanë një sëmundje akute të rëndë me temperaturë të lartë trupore.


5. A ËSHTË I SIGURT VAKSINIMI KUNDËR INFEKSIONEVE ME HPV?

Vaksinimi kundër infeksioneve me HPV është shumë i sigurt. Mund të shfaqen efekte anësore, të cilat zakonisht janë të lehta dhe kalimtare. Më shpesh, këto janë reaksione lokale në vendin e vaksinimit (dhimbje, skuqje, ënjtje), lodhje, të vjella dhe dhimbje koke. Efektet anësore serioze janë shumë të rralla.

Më shumë informacion mbi vaksinimin kundër infeksioneve me HPV mund të merrni nga mjeku i shkollës ose nga faqja e internetit e NIJZ: <https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-okuzbam-s-hu>.

Organizata Botërore e Shëndetësisë mbledh të dhëna mbi efektet anësore në shumë shtete dhe përcakton se HPV është i sigurt.

INFEKSIONET ME



DHE VAKSINIMI i vajzave dhe djemve

Informacione të rëndësishme për prindërit dhe deklarata



Shumica e personave seksualisht aktivë infektohen me HPV të paktën një herë gjatë jetës së tyre.

1. ÇFARË ËSHTË HPV?

Infeksionet me viruset papilloma humane (HPV) janë disa nga infeksionet më të zakonshme seksualisht të transmetueshme në botë dhe gjithashtu në Slloveni. Personat e infektuar zakonisht nuk kanë shenja të sëmundjes, megjithatë ata mund ta transmetojnë infeksionin te të tjerët. Te shumica e njerëzve infeksioni seksual zhduket spontanisht, por te disa mund të zhvillohet një infeksion i përhershëm. Gjatë jetës, pothuajse çdo person infektohet me HPV.

Trajtimi i sëmundjeve që shkaktohen si pasojë e infeksionit me HPV është i gjatë dhe jo gjithmonë i suksesshëm.

Pas një infeksioni të përhershëm me genotype më të rrezikshme të HPV, mund të shfaqen ndryshime parakanceroze dhe kancer i qafës së mitrës, si dhe disa lloje të tjera të kancerit të organeve gjenitale, anusit dhe pjesës së gojës, si te gratë ashtu edhe te burrat. Infeksioni me genotype më pak të rrezikshme mund të shkaktojë lytha gjenitalë te të dyja gjinitë.

Si pasojë e infeksionit me HPV, në Slloveni çdo vit sëmurën më shumë se 150 gra dhe më shumë se 40 burra me kancer, ndërsa rreth 1600 gra trajtohen çdo vit për ndryshime parakanceroze në qafën e mitrës.

Mbi 99% e rasteve të kancerit të qafës së mitrës, 25-78% të kancereve të tjera gjenitale, 88% të kancerit të anusit dhe 31% të kancerit në pjesën e gojës janë rezultat i një infeksioni të përhershëm me një nga genotipet më të rrezikshme të HPV-së.

2. VAKSINA KUNDËR INFEKSIONEVE ME HPV - PSE ËSHTË E RËNDËSISHME?

Vaksina që është e disponueshme në Slloveni për vaksinimin kundër infeksioneve me HPV është një vaksinë rekombinante (e vdekur), e cila parandalon në mënyrë shumë efektive infeksionin me genotipet më të zakonshme dhe më të rrezikshme që shkaktojnë kancerin e qafës së mitrës dhe disa lloje të tjera të kancerit si te gratë ashtu edhe te burrat. Vaksina gjithashtu mbron kundër zhvillimit të lythave gjenitalë.

Mbrojtja pas vaksinimit është afatgjate.

Vaksinimi nuk mbron kundër të gjithë llojeve të HPV që shkaktojnë kancer, prandaj për të gjitha vajzat adoleshente, edhe ato të vaksinuara, janë të nevojshme kontrole të rregullta gjinekologjike. Kanceri i qafës së mitrës është i pari kancer që mund të parandalohet me vaksinim kundër HPV dhe kontrole të rregullta gjinekologjike në kuadër të programit ZORA.

Deklaratë mbi vaksinimin kundër infeksioneve me HPV (ruajtja në kartelën shëndetësore)

Nënskruesi/nënskruësja: _____ Përfaqësuesi ligjor i vajzës/djalit

Emri dhe mbiemri: _____ E lindur/e _____

JAM DAKORD me vaksinimin

NUK JAM DAKORD me vaksinimin

(Ju lutem rrethoni përgjigjen përkatëse)

Data _____ Nënskrimi i përfaqësuesit ligjor _____

Nëse pajtoheni me vaksinimin e vajzës/djalit tuaj kundër HPV-së, ju lutemi përgjigjeni në pyetjet e mëposhtme:

A është aktualisht i shëndetshëm vajza/djalli juaj (nëse jo, përshkruani problemet)? PO / JO _____

A merr ndonjë ilaç? Cilin? PO / JO _____

A ka pasur ndonjëherë një alergji të rëndë ndaj ilaçeve? Cilat? PO / JO _____

A ka pasur fëmija juaj ndonjëherë një reaksion të rëndë pas vaksinimit? Nga cila vaksinë? PO / JO _____

A dëshironi të na thoni diçka tjetër? Është e rëndë pas vaksinimit? Nga cila vaksinë? PO / JO _____

Njoftim mbi vaksinimin kundër infeksioneve me HPV në kontrollin sistematik

Të nderuar prindër!

Për vajzën/djalin tuaj është planifikuar një kontroll sistematik më datën _____ në _____.

Ky kontroll do të zhvillohet sipas programit për kontrollin sistematik në klasën e gjashtë.

Pas përfundimit të kontrollit, me miratimin tuaj, do të kryejmë vaksinimin kundër infeksioneve me viruse papilloma humane (HPV).

Vaksina është falas.

Për vaksinimin e plotë nevojiten dy doza të vaksinës. Doza e parë do të jepet gjatë kontrollit sistematik në klasën e gjashtë, ndërsa doza e dytë do të jepet, me mundësi, pas 6 muajsh.

Po bashkëngjitemi një fletë me informacion mbi vaksinimin kundër infeksioneve me HPV.

Nëse ju dhe fëmija ju dëshironi që të bëjmë vaksinimin, kemi nevojë për miratimin tuaj. Prandaj, ju lutemi të lexoni informacionet mbi vaksinimin kundër infeksioneve me HPV dhe të plotësoni "Deklaratën për vaksinimin kundër infeksioneve me HPV", e cila është pjesë e fletës së bashkëngjitur.

Ju lutemi që fëmija juaj të marrë me vete në kontrollin sistematik: - Kartën e sigurimit shëndetësor, - Librit të vaksinimeve ose të dhënat mbi vaksinimet e kryera, - "Deklaratën për vaksinimin kundër infeksioneve me HPV" të plotësuar.

Mjeku i shkollës tuaj

Informacion të mëtejshëm mbi vaksinimin kundër infeksioneve me HPV mund të merrni nga mjeku i shkollës dhe në faqen e internetit të NIJZ:

<https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-okuzbam-s-humanimi-papilomavirusi>.