

## Priporočila za uporabo kombiniranih cepiv pri otrocih »zamudnikih«

V Sloveniji imamo za cepljenje otrok proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, okužbi s Hib in hepatitisu B na voljo naslednja kombinirana cepiva, ki so registrirana, kakor je navedeno (povzeto iz SmPC):

- **Hexyon** (šestvalentno cepivo)
  - za osnovno in obnovitveno cepljenje dojenčkov in malčkov starejših od 6 tednov proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, hepatitisu B in boleznim, ki jih povzroča *Haemophilus influenzae* tipa b
- **Adacel** (di/Te/per)
  - za obnovitveno cepljenje oseb, starejših od 4 let, proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju;
- **diTeBooster** (di/Te)
  - za cepljenje proti davici in tetanusu oseb, starejših od 5 let.

Pri otrocih »zamudnikih« starejših od enega leta (s cepljenjem pričnejo ali nadaljujejo kasneje kot predpisuje Program), upoštevamo sledeče:

- Pri otrocih »zamudnikih«, **mlajših od 5 let, uporabimo šestvalentno cepivo** in jih cepimo po shemi 2+1 (drugi odmerek naj prejmejo najmanj osem tednov po prvem odmerku in tretji odmerek najmanj 6 mesecev po drugem odmerku) oziroma dodamo manjkajoče odmerke **šestvalentnega cepiva**.

***Izjema:** otroci, ki so v prvem letu starosti dobili 3 osnovne odmerke petvalentnega cepiva, morajo prejeti še poživitveni odmerek (stara shema 3+1) najmanj 6 mesecev po tretjem odmerku petvalentnega cepiva (ne glede na časovno oddaljenost od tretjega odmerka petvalentnega cepiva).*

*Pri zamudnikih, mlajših od 5 let, se za poživitveni odmerek uporabi šestvalentno cepivo. Pri teh otrocih je smiselno, da nadaljujejo s cepljenjem proti hepatitisu B z dvema odmerkoma monovalentnega cepiva proti hepatitisu B (prvi odmerek monovalentnega cepiva naj prejmejo vsaj en mesec po cepljenju s šestvalentnim cepivom in drugi odmerek monovalentnega cepiva pet mesecev kasneje).*

*Pri zamudnikih, ki so starejši od pet let, se za poživitveni odmerek uporabi cepivo di/Te/per + IPV<sup>#</sup>.*

Otroci, ki so že pričeli s cepljenjem proti hepatitisu B z monovalentnim cepivom in so zamudniki za cepljenje s šestvalentnim cepivom (npr. otroci, ki prihajajo iz drugih držav), naj pričnejo/nadaljujejo s cepljenjem s šestvalentnim cepivom po običajni shemi (2+1).

- Pri otrocih »zamudnikih«, **starih 5 let in starejših**, uporabimo cepivo **di/Te + IPV<sup>#</sup>** (za 1. in 2. odmerek) oz. **di/Te/per + IPV<sup>#</sup>** (za 3. odmerek) in cepimo po shemi 2+1 (0,1,6) oziroma dodamo manjkajoče odmerke.

Pri otrocih (tudi dojenčkih), ki ne smejo biti cepljeni proti oslovskemu kašlju, uporabimo cepivo di/Te (+ IPV<sup>#</sup> + Hib<sup>&</sup> +hep B) in jih cepimo po shemi 2+1.

Inaktivirana cepiva lahko dajemo sočasno ali v kakršnem koli razmiku do drugih živih ali mrtvih cepiv.

---

<sup>#</sup> IPV - inaktivirano cepivo proti otroški paralizi;

<sup>&</sup> Hib - cepivo proti hemofilusu influence tipa b; po enem letu starosti (do 5. leta) zadostuje en odmerek