

Lymska borelioza

V letu 2025 smo do vključno 23. tedna prejeli 840 prijav obolenj z lymsko boreliozo. Zbolelo je 458 žensk in 382 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v goriški statistični regiji (140,5/100.000 prebivalcev), sledita gorenjska (59,7/100.000 prebivalcev) in osrednjeslovenska (46,0/100.000 prebivalcev).

Slika 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze, po tednih, Slovenija





Tabela 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po starosti, Slovenija, 2025

Starost	Št. primerov/100.000
<1	5,9
1-4	56,1
5-14	55,2
15-24	21,5
25-34	19,8
35-44	22,7
45-54	42,9
55-64	53,2
65-74	58,3
75+	35,8
Skupaj	39,5

Slika 2: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, 2025



Klopni meningoencefalitis (KME)

V letu 2025 smo do vključno 23. tedna prejeli 13 prijav obolenj s klopnim meningoencefalitisom. Zbolele so 3 ženske in 10 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v jugovzhodno slovenski statistični regiji (2,7/100.000 prebivalcev), sledita primorsko-notranjska (1,8/100.000 prebivalcev) in koroška (1,4/100.000 prebivalcev).

Slika 3: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa, po tednih, Slovenija




Tabela 2: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa/100.000 prebivalcev, po starosti, Slovenija, 2025

Starost	Št. primerov/100.000
<1	0,0
1-4	0,0
5-14	0,9
15-24	0,5
25-34	0,9
35-44	0,0
45-54	0,6
55-64	1,0
65-74	1,2
75+	0,0
Skupaj	0,6

Slika 4: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, 2025

