

Lymska borelioza

V letu 2025 smo do vključno 24. tedna prejeli 932 prijav obolenj z lymsko boreliozo. Zbolelo je 513 žensk in 419 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v goriški statistični regiji (154,1/100.000 prebivalcev), sledita gorenjska (67,8/100.000 prebivalcev) in osrednjeslovenska (51,9/100.000 prebivalcev).

Slika 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze, po tednih, Slovenija





Tabela 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po starosti, Slovenija, 2025

Starost	Št. primerov/100.000
<1	5,9
1-4	62,8
5-14	62,1
15-24	22,5
25-34	22,8
35-44	25,3
45-54	46,7
55-64	57,6
65-74	66,4
75+	40,1
Skupaj	43,8

Slika 2: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, 2025



Klopni meningoencefalitis (KME)

V letu [2025](#) smo do vključno [24.](#) tedna prejeli [14](#) prijav obolenj s klopnim meningoencefalitisom. Zbolele so [4](#) ženske in [10](#) moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v primorsko-notranjski statistični regiji (3,7/100.000 prebivalcev), sledita jugovzhodna slovenija (2,7/100.000 prebivalcev) in koroška (1,4/100.000 prebivalcev).

Slika 3: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa, po tednih, Slovenija




Tabela 2: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa/100.000 prebivalcev, po starosti, Slovenija, [2025](#)

Starost	Št. primerov/100.000
<1	0,0
1-4	0,0
5-14	0,9
15-24	0,5
25-34	0,9
35-44	0,0
45-54	0,6
55-64	1,0
65-74	1,5
75+	0,0
Skupaj	0,7

Slika 4: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, [2025](#)

