

Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrtno poročilo, 1. januar – 31. marec 2025

V obdobju od 1. januarja do 31. marca 2025 je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (1) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **419 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 237 pri moških in 180 pri ženskah. Za dve prijavi podatek o spolu osebe ni bil na voljo.

Prijavljenih je bilo 160 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe (91 pri moških, 68 pri ženskah, za eno prijavo podatek o spolu ni bil na voljo), od tega sedem primerov veneričnega limfogranuloma (vsi pri moških, od katerih jih je šest navedlo, da so imeli vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze). Prijavljenih je bilo 57 primerov gonoreje (45 pri moških, 11 pri ženskah, za eno prijavo podatek o spolu ni bil na voljo), 16 primerov zgodnjega sifilisa (13 pri moških in tri pri ženskah) in štiri primeri neopredeljenega sifilisa (vsi pri moških). Med ostalimi prijavljenimi SPO po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo 98 primerov genitalnih bradavic, 39 primerov genitalnega herpesa, 13 primerov nespecifičnega uretritisa, dva primera trihomonioze in en primer iztoka iz uretre pri moškem. Prijavljenih je bilo tudi 29 primerov neopredeljene SPO, med katerimi je bila pri 13 primerih dokazana okužba z urogenitalnimi mikoplazmami.

Med 45 prijavljenimi primeri gonoreje pri moških je pri 19 primerih moški navedel vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze. Med 13 prijavljenimi primeri zgodnjega sifilisa pri moških je pri šestih primerih moški navedel vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so 57 % primerov SPO prijavili dermatovenerologi, 16 % primerov ginekologi, 9 % primerov infektologi, 4 % primerov epidemiologi, po 3 % specialisti splošne medicine in mikrobiologi. Štiri primere so prijavili pediatri, dva primera specializanta splošne medicine in po en primer so prijavil transfuziolog, specialist urgentne medicine, specialist abdominalne kirurgije in specialistka interne medicine. Pet odstotkov primerov so prijavili laboratoriji. Za štiri primere podatek o prijavitelju ni bil na voljo.

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenca SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj pogostosti teh okužb med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavni incidenci SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **Tabeli 1** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2025.

V **Tabeli 2** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2025.

Tabela 1: Število prijavljenih primerov in prijave incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji, 1. januar – 31. marec 2025

Regija bivanja	Spol	Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba	
		Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000
Celje	ženska	0	0,0	0	0,0	8	5,3
	moški	2	1,3	10	6,3	13	8,3
	skupaj	2	0,6	10	3,2	21	6,8
Nova Gorica	ženska	0	0,0	0	0,0	4	8,0
	moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	skupaj	0	0,0	0	0,0	4	3,9
Koper	ženska	0	0,0	1	1,3	8	10,3
	moški	0	0,0	4	5,1	5	6,3
	skupaj	0	0,0	6*	3,8	14*	9,0
Kranj	ženska	0	0,0	0	0,0	13	12,5
	moški	2	1,9	2	1,9	9	8,5
	skupaj	2	1,0	2	1,0	22	10,5
Ljubljana	ženska	2	0,6	6	1,7	14	4,0
	moški	5	1,5	19	5,6	41**	12,0
	skupaj	7	1,0	25	3,6	55	8,0
Maribor	ženska	1	0,6	2	1,2	8	4,9
	moški	2	1,2	7	4,2	11**	6,6
	skupaj	3	0,9	9	2,7	19	5,7
Murska Sobota	ženska	0	0,0	1	1,8	3	5,3
	moški	1	1,8	0	0,0	1	1,8
	skupaj	1	0,9	1	0,9	4	3,5
Novo mesto	ženska	0	0,0	1	1,4	8	11,2
	moški	0	0,0	1	1,3	1	1,3
	skupaj	0	0,0	2	1,4	9	6,2
Ravne	ženska	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	0	0,0	1	2,8
	skupaj	0	0,0	0	0,0	1	1,4
Neznana/tujina	ženska	0	-	0	-	2	-
	moški	1	-	2	-	9**	-
	skupaj	1	-	2	-	11	-
Skupaj	ženska	3	-	11	-	68	-
	moški	13	-	45	-	91	-
	skupaj	16	-	57*	-	160*	-

Vir: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (NUJZ 53), 30. 4. 2025.

* Podatek o spolu ni bil na voljo.

** Med klamidijskimi okužbami je bilo prijavljenih sedem primerov LGV (trije primeri v ljubljanski, en primer v mariborski in dva primera v ravenski regiji).

Tabela 2: Število prijavljenih primerov in prijave incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji, 1. januar – 31. marec 2025

Starostna skupina (v letih)	Spol	Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba	
		Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000
<15	ženska	0	0,0	0	0,0	2	1,3
	moški	0	0,0	1	0,6	0	0,0
	skupaj	0	0,0	1	0,3	2	0,6
15-19	ženska	0	0,0	2	3,9	4	7,8
	moški	0	0,0	1	1,8	4	7,4
	skupaj	0	0,0	3	2,8	8	7,5
20-24	ženska	0	0,0	2	4,1	26	53,7
	moški	1	1,8	7	12,8	22**	40,2
	skupaj	1	1,0	9	8,7	48	46,5
25-29	ženska	1	2,0	2	3,9	14	27,4
	moški	2	3,3	5	8,3	20**	33,1
	skupaj	3	2,7	7	6,3	34	30,5
30-34	ženska	0	0,0	5	8,9	9	16,1
	moški	0	0,0	9	13,9	18**	27,8
	skupaj	0	0,0	15*	12,4	28*	23,2
35-44	ženska	2	1,4	0	0,0	9	6,4
	moški	5	3,1	16	10,1	19**	11,9
	skupaj	7	2,3	16	5,3	28	9,3
45-64	ženska	0	0,0	2	0,7	4	1,4
	moški	4	1,3	6	1,9	7**	2,2
	skupaj	4	0,7	8	1,3	11	1,8
≥65	ženska	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	1	0,5	0	0,0	1	0,5
	skupaj	1	0,2	0	0,0	1	0,2
Skupaj	ženska	3		11		68	
	moški	13		45		91	
	skupaj	16		57*		160*	

Vir: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (NIJZ 53), 30. 4. 2025.

* Podatek o spolu ni bil na voljo.

** Med klamidijskimi okužbami je bilo prijavljenih sedem primerov LGV (po en primer v starostnih skupinah 25-29, 30-34 in 45-64 let in po dva primera v starostnih skupinah 20-24 in 35-44 let).

Med prijavljenimi primeri klamidijskih okužb pri osebah, mlajših od 15 let, je v obeh primerih šlo za novorojenega otroka s klamidijsko okužbo očesne veznice. Med prijavljenimi primeri gonoreje pri osebah, mlajših od 15 let, je šlo za novorojenega otroka z gonokokno okužbo očesa.

Izčrpnejši podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v letnem poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji v letu 2023« (2).

REFERENCI

- 1) Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22). Dostopno 30. 4. 2025 na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433>
- 2) Klavs I, Berlot L, Kustec T, Avsec M, Učakar V, Germ J et al. Spolno prenesene okužbe v Sloveniji v letu 2023. Spolno prenesene okužbe v Sloveniji. 2025;1-23. Dostopno 30. 4. 2025 na: <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/spremljanje-nalezljivih-bolezni/spolno-prenesene-okuzbe-v-sloveniji/>