

Lymska borelioza

V letu 2025 smo do vključno 33. tedna prejeli 3006 prijav obolenj z lymsko boreliozo. Zbolelo je 1685 žensk in 1321 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v goriški statistični regiji (293,8/100.000 prebivalcev), sledita gorenjska (202,9/100.000 prebivalcev) in osrednjeslovenska (167,0/100.000 prebivalcev).

Slika 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze, po tednih, Slovenija





Tabela 1: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po starosti, Slovenija, 2025

Starost	Št. primerov/100.000
<1	5,9
1-4	211,9
5-14	177,8
15-24	65,5
25-34	72,4
35-44	93,3
45-54	146,1
55-64	196,1
65-74	216,9
75+	129,0
Skupaj	141,1

Slika 2: Število prijavljenih primerov lymske borelioze/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, 2025



Klopni meningoencefalitis (KME)

V letu 2025 smo do vključno 33. tedna prejeli 54 prijav obolenj s klopnim meningoencefalitisom. Zbolelo je 22 žensk in 32 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v gorenjski statistični regiji (7,1/100.000 prebivalcev), sledita primorsko-notranjska (5,6/100.000 prebivalcev) in jugovzhodna slovenija (4,7/100.000 prebivalcev).

Slika 3: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa, po tednih, Slovenija




Tabela 2: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa/100.000 prebivalcev, po starosti, Slovenija, 2025

Starost	Št. primerov/100.000
<1	0,0
1-4	2,7
5-14	2,3
15-24	1,9
25-34	2,6
35-44	1,3
45-54	1,9
55-64	3,7
65-74	4,6
75+	1,9
Skupaj	2,5

Slika 4: Število prijavljenih primerov klopnega meningoencefalitisa/100.000 prebivalcev, po občinah, Slovenija, 2025

