

Redna cepljenja otrok in odraslih ter cepljenje zamudnikov v skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2025 (tabelarični prikaz)

Tabela 1: Cepljenje šolskih in predšolskih otrok – redna cepljenja in zamudniki [§]

CEPIVO	OBIČAJNA SCHEMA CEPLJENJA	SCHEME CEPLJENJA ZAMUDNIKOV	ZAMUDNIKI* (STAROSTNE MEJE)
Davica, tetanus, oslovski kašelj, hemofilus influence tip b, otroška paraliza, hepatitis B	• prvi odmerek: 3 mesece • drugi odmerek: 5 mesecev • tretji odmerek: 11-18 mesecev	• 3 odmerki (0,2,8)	• Do dopolnjenega 5. leta starosti
Davica, tetanus (Di/Te)	/	• Prvi in drugi odmerek Di/Te; tretji odmerek Di/Te/Per (0,1,6) • Poživitveni odmerki v skladu s programom cepljenja	• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti
Davica, tetanus, oslovski kašelj (Di/Te/Per)	• poživitveni odmerek: 2. razred OŠ in v srednji šoli	• 3 odmerki (0,1,6)	• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti
Otroška paraliza	/	• 3 odmerki (0,1,6)	• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti
Hepatitis B (otroci, cepljeni s petvalentnim cepivom)	• prvi in drugi odmerek: pred vstopom v šolo (z vsaj enomesečnim razmikom)**; • tretji odmerek: 2. razred	• 3 odmerki (0,1,6)	• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti
Ošpice, mumps, rdečke, norice^{§§}	• prvi odmerek: 11-18 mesecev • drugi odmerek: 3 leta	• 2 odmerka (0,1)	• Do dopolnjenega 26. leta starosti
Pnevmokokne okužbe (20-valentno cepivo)	• prvi odmerek: 3 mesece • drugi odmerek: 5 mesecev • tretji odmerek: 6 mesecev • poživitveni odmerek: 11-18 mesecev	• 7-11 mesecev: 3 odmerki (drugi odmerek 4 tedne po prvem; tretji odmerek v drugem letu starosti in vsaj 8 tednov po drugem odmerku) • 12-23 mesecev: 2 odmerka (0,2) • 2-5 let: 1 odmerek	• Do dopolnjenega 5. leta starosti
Klopni meningoencefalitis (KME)[#]	• prvi odmerek: po dopolnjenem enem letu starosti • drugi odmerek: 1-3 mesece ali 14 dni (hitra shema) po prvem odmerku • tretji odmerek: 5-12 mesecev po drugem odmerku • poživitveni odmerki na 3 oz. 5 let	• 3 odmerki (drugi odmerek 1-3 mesece ali 14 dni (hitra shema) po prvem, tretji odmerek 5-12 mesecev po drugem odmerku) • poživitveni odmerki na 3 oz. 5 let	• Rojeni leta 2016 ali kasneje^{##}
Humani papilomavirusi	• dva odmerka: 6. razred OŠ (0,6)	• 9-14 let: 2 odmerka (0,6) • 15 let ali več: 3 odmerki (0,2,6)	• cepljenje v breme OZZ pripada vsem dekletom in fantom do dopolnjenega 26. leta starosti

* Zamudniki so vse osebe, ki niso bile cepljene v časovnih okvirjih, opredeljenih s strani programa cepljenja; **cepljenje pri njih se opravi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)**

** Razen za otroke, ki so bili cepljeni s 6-valentnim cepivom (rojeni od oktobra 2019 naprej)

Osebam pripadajo trije odmerki cepiva v breme OZZ (osnovna shema ali poživitveni odmerki)

Za zamudnice in zamudnike bo cepljenje proti KME na voljo v breme OZZ dokler ne dopolnijo 26. let.

§ Za osebe z zdravstvenimi ali epidemiološkimi indikacijami so priporočila dostopna na spletni strani: <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/> in <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/>

§§ Za otroke rojene od februarja 2024; otroci rojeni pred februarjem 2024 so cepljeni proti OMR (drugi odmerek prejmejo v starosti 5-6 let)

Tabela 2: Cepljenje odraslih - redna cepljenja in zamudniki*

CEPIVO	SHEMA CEPLJENJA	FINANCIRANJE
Davica, tetanus (Di/Te)	poživitveni odmerek Di/Te na 10 let	v breme OZZ
Davica, tetanus, oslovski kašelj (Di/Te/Per)	- nosečnice po 24 tednu nosečnosti (en odmerek; v vsaki nosečnosti); - za ostale odrasle se priporoča enkrat v odrasli dobi (namesto Di/Te)	- nosečnice v breme OZZ; - ostali samoplačniško
Klopni meningoencefalitis (KME)[#]	3 odmerki (drugi odmerek 1-3 mesece ali 14 dni (hitra shema) po prvem, tretji odmerek 5-12 mesecev po drugem odmerku) - prvi poživitveni odmerek po 3 letih, nato vsakih 5 let; po 60. letu starosti na tri leta	- v breme OZZ za osebe, ki v tekočem letu dopolnijo 45, 46 ali 47 let oziroma za zamudnike (v letu 2025 so do cepljenja v breme OZZ upravičene osebe, rojene od 1970 do 1980)[#] - ostali samoplačniško
Pnevmokokne okužbe (20-valentno cepivo)	cepljenje z enim odmerkom PCV20	v breme OZZ za skupine z visokim tveganjem[#], kronične bolnike in osebe stare ≥65 let
Respiratorni sincicijski virus (RSV)	nosečnice od 24. do vključno 36. tedna nosečnosti (en odmerek)	v breme OZZ

[#] Osebam pripadajo trije odmerki cepiva v breme OZZ (osnovna shema ali poživitveni odmerki)

^{##} Osebe z okrnjeno imunostjo, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, likvor fistulo ali polževim vsadkom

* Za osebe z zdravstvenimi ali epidemiološkimi indikacijami so priporočila (vključno s financiranjem) dostopna na spletni strani: <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/> in <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/>

Vsem osebam, starejšim od 6 mesecev, pripada tudi brezplačno **sezonsko cepljenje proti gripi**. Priporočila za cepljenje proti **covidu-19** so na voljo na naslednji povezavi: <https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/>

Več informacij je na voljo v Programu cepljenja in Navodilih za izvajanje programa cepljenja (<https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/>), Navodilih in priporočilih za posamezna cepljenja ter v Priporočilih za uporabo kombiniranih cepiv pri otrocih »zamudnikih« (<https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/>).