

2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA





2.1. UMRJIVOST

V letu 2024 je umrlo 21.506 prebivalcev Slovenije, od tega 10.733 moških in prav tako žensk, oziroma 34 prebivalcev manj kot v preteklem letu. Stopnja umrljivosti je v zadnjih treh desetletjih v Sloveniji in EU upadala. Povprečna starost umrlih se zvišuje. Moški so v povprečju doživeli 76 let, ženske pa 83 let starosti.

Podatki o umrljivosti sodijo med najzanesljivejše podatke zdravstvene statistike in so osnova za izračun nekaterih kazalnikov zdravstvenega stanja prebivalstva. Skupaj z drugimi pomembnimi kazalniki predstavljajo temelj za načrtovanje zdravstvenega varstva in zdravstvene politike v državi.

V Sloveniji se je epidemija covid-19 (virus SARS-CoV-2) uradno končala 15. junija 2021. Stopnja umrljivosti je bila v letu 2024 za 8 % nižja kot leta 2021.


Prezgodnja umrljivost je pri moških več kot dvakrat višja kot pri ženskah. Najpogostejši vzrok prezgodnje umrljivosti pri ženskah in moških so neoplazme.

Vodilni vzroki za smrt prebivalcev Slovenije so glede na število umrlih na 1.000 prebivalcev (groba stopnja) bolezni obtočil (med najpogostejše sodijo srčni infarkt, možganska kap, odpoved srca in drugi vzroki) ter neoplazme (rak prebavil, prostate, dojke in pljuč), ki so v letu 2024 predstavljale vzrok za 68 % vseh smrti. Pri moških je število neoplazem na prvem mestu, sledijo bolezni obtočil, pri ženskah pa ravno obratno. Zaporedje vodilnih vzrokov smrti prebivalcev Slovenije ostaja enako.

V letu 2024 je 1.632 prebivalcev umrlo zaradi posledic zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti, najpogostejše zaradi padcev (838 prebivalcev). Na drugem mestu so samomori (363 prebivalcev), ki so trikrat pogostejši pri moških.

Umrjivost dojenčkov je pomemben kazalnik kakovosti zdravstvenega varstva ter vpliva drugih determinant zdravja in kulture prebivalstva. V letu 2024 je v Sloveniji umrlo 29 dojenčkov.

2.1. Slika 1: **Vodilna vzroka smrti** po spolu, Slovenija, 2015–2024



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).



UMRLJIVOST V LETU 2024

21.506 umrlih oseb
v povprečni starosti **79 let**



VODILNI VZROKI UMRLJIVOSTI

Bolezni srca in ožilja (bolezni obtočil) ter rak (neoplazme) predstavljajo vzrok za kar **68 %** vseh smrti prebivalcev Slovenije.



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Delež prezgodnjih smrti je pri moških višji, kot pri ženskah.



VSAK DAN v povprečju umre:

BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

Najpogosteje zaradi srčne odpovedi, srčne kapi ali možganske kapi.



umrle osebe
21/dan

RAK

Najpogosteje zaradi raka pljuč, debelega črevesja in danke, prostate ali dojke.



19/dan

ZUNANJI VZROKI

Najpogosteje zaradi padcev ali samomorov.



4/dan

BOLEZNI ŽIVČEVJA


Najpogosteje zaradi Alzheimerjeve ali Parkinsonove bolezni.



3/dan

OSTALI VZROKI

11/dan

2.1. Slika 2: **Povprečna starost ob smrti po spolu, Slovenija, 1990–2024**

Umrli in povprečna starost



76 let

V letu 2024 je umrlo
21.506
prebivalcev Slovenije.




83 let

Povprečna starost

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Povprečna starost umrlih se je v zadnjem desetletju (2015–2024) zvišala za 2,3 let (pri moških za 2,9 in pri ženskah za 1,7 let).

2.1. Slika 3: **Povprečna starost ob smrti po spolu, Slovenija, 2004 in odmik 2004/1995, 2014 in odmik 2014/2005, 2024 in odmik 2024/2015**

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 1: *Umrli in stopnja umrljivosti po spolu, Slovenija, 2015–2024*

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Število umrlih											
SKUPAJ	Moški	9.739	9.673	10.136	10.113	10.112	11.733	11.841	11.136	10.945	10.773
	Ženske	10.095	10.016	10.373	10.372	10.476	12.283	11.420	11.356	10.595	10.733
	SKUPAJ	19.834	19.689	20.509	20.485	20.588	24.016	23.261	22.492	21.540	21.506
0–64 let	Moški	2.590	2.487	2.398	2.294	2.265	2.280	2.454	2.215	2.167	1.995
	Ženske	1.127	1.079	1.141	1.091	1.023	1.003	1.035	1.037	878	919
	SKUPAJ	3.717	3.566	3.539	3.385	3.288	3.283	3.489	3.252	3.045	2.914
Stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev											
SKUPAJ	Moški	952,4	944,7	987,9	981,6	966,9	1.112,7	1.119,1	1.051,4	1.026,1	1.006,9
	Ženske	970,2	962,7	997,2	997,5	1.004,0	1.174,7	1.088,8	1.082,0	1.004,9	1.016,0
	SKUPAJ	961,4	953,8	992,6	989,6	985,4	1.143,6	1.104,0	1.066,6	1.015,6	1.011,4
0–64 let	Moški	298,3	288,1	278,9	267,5	261,3	262,2	283,1	256,6	250,2	230,7
	Ženske	137,4	132,3	140,7	135,5	127,2	125,2	129,5	130,3	110,3	115,8
	SKUPAJ	220,1	212,4	211,8	203,6	196,8	196,6	209,4	196,0	183,2	175,7
Starostno standardizirana stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev											
SKUPAJ	Moški	717,3	692,2	701,0	680,2	661,1	737,0	731,9	680,7	651,3	613,7
	Ženske	420,2	404,3	412,8	402,3	395,0	442,0	422,2	413,0	379,7	374,9
	SKUPAJ	552,2	533,5	537,6	525,5	517,0	575,5	563,1	535,8	504,0	484,8
0–64 let	Moški	238,0	229,5	218,0	210,3	207,9	209,2	224,0	204,1	199,1	181,9
	Ženske	106,6	102,8	108,0	102,5	95,8	95,8	98,4	98,7	85,1	88,4
	SKUPAJ	173,3	167,0	162,2	157,2	153,0	153,6	162,5	152,5	143,2	136,2

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).




2.1. Tabela 2: **Umrli dojenčki** po spolu, Slovenija, 2015–2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Število umrlih dojenčkov										
Dečki	18	20	21	22	25	24	22	29	18	13
Deklice	15	21	21	11	15	17	13	15	13	16
SKUPAJ	33	41	42	33	40	41	35	44	31	29
Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih otrok										
Dečki	1,7	2,0	2,0	2,2	2,5	2,5	2,3	3,3	2,1	1,5
Deklice	1,5	2,1	2,2	1,2	1,6	1,9	1,4	1,8	1,6	2,0
SKUPAJ	1,6	2,1	2,1	1,7	2,1	2,2	1,9	2,5	1,8	1,7

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46) in Perinatalni informacijski sistem.

2.1. Slika 4: **Umrli dojenčki** po spolu, Slovenija, 1985–2024



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46) in Perinatalni informacijski sistem.


V zadnjem desetletju se v Sloveniji število umrlih dojenčkov zmanjšuje.

Stopnja umrljivosti dojenčkov je v Sloveniji ena od najnižjih v primerjavi z državami članicami Evropske unije.

V Sloveniji sta v letu 2024 v povprečju umrla 1,7 dojenčka na 1.000 živorojenih otrok, kar predstavlja 13 dečkov in 16 deklic.



2.1. Tabela 3: **Umrli** po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2024



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

V letu 2024 beležimo **rahal upad stopnje umrljivosti**.
V primerjavi z letom 2023 se je **znižala za 0,4 %**.


**Najvišje stopnje umrljivosti so v višjih starostnih skupinah;
70 let in več.**

Odmiki od predhodnega leta, se vsako leto zelo spreminjajo.
V letu 2024 je bil:

- najvišji odmik v smeri **upada**, v starostni skupini 10–19 let. Upad stopenj umrljivosti je beležen tudi v višjih starostnih skupinah, razen v starostni skupini 90 let in več,
- najvišji odmik **v porast** je v starostni skupini 0–9 let, kjer je število smrti nizko in se iz leta v leto smeri odmika lahko zelo spreminjajo.



Pred 65. letom starosti je v Sloveniji umrlo **2.914 oseb** (**14 %** od vseh umrlih)




Vodilni vzroki prezgodnje umrljivosti so enaki pri obeh spolih



V letu 2024 je umrlo 2.914 prebivalcev Slovenije, ki so bili mlajši od 65 let. Delež takih smrti je pri moških višji kot pri ženskah. **V letu 2024 je prezgodaj umrlo več kot dvakrat več moških v primerjavi z ženskami** (1.995 moških in 919 žensk). **Na vrhu skupin vzrokov ostajajo neoplazme**, sledijo **bolezni obtočil**, **zunanji vzroki obolevnosti**, nato **ostali vzroki**.

2.1. Slika 5: **Umrli, 0–64 let po spolu, Slovenija, 2015–2024**

Na 100.000 prebivalcev starostne skupine



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Stopnja prezgodnje umrljivosti je od leta 2015 v počasnem upadu.


2.1. Tabela 4: **Umrli in stopnja umrljivosti** po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2024

Poglavje MKB-10			Število umrlih			Stopnja umrljivosti na 100.000 preb.		
			Moški	Ženske	SKUPAJ	Moški	Ženske	SKUPAJ
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00-B99	219	221	440	20,5	20,9	20,7
II.	Neoplazme	C00-D48	3.898	3.076	6.974	364,3	291,2	328,0
III.	Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv	D50-D89	14	16	30	1,3	1,5	1,4
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E90	195	175	370	18,2	16,6	17,4
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	415	112	527	38,8	10,6	24,8
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	474	739	1.213	44,3	70,0	57,0
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	-	-	-	-	-	-
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	-	-	-	-	-	-
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	3.237	4.474	7.711	302,5	423,5	362,6
X.	Bolezni dihal	J00-J99	458	451	909	42,8	42,7	42,7
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	418	377	795	39,1	35,7	37,4
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	2	3	5	0,2	0,3	0,2
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00-M99	40	76	116	3,7	7,2	5,5
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	24	57	81	2,2	5,4	3,8
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00-O99	-	-	-	-	-	-
XVI.	Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00-P96	8	11	19	0,7	1,0	0,9
XVII.	Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm.	Q00-Q99	24	11	35	2,2	1,0	1,6
XVIII.	Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi, neuvr. drugje	R00-R99	414	235	649	38,7	22,2	30,5
XX.	Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti	V01-Y98	933	699	1.632	87,2	66,2	76,8
SKUPAJ			10.773	10.733	21.506	1.006,9	1.016,0	1.011,4

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).


V letu 2024 je pri obeh spolih še vedno visoko število umrlih zaradi nalezljivih bolezni (Poglavje MKB-10-AM, Nekate infekcijske in parazitarne bolezni) v primerjavi z letom 2019, ko je bilo pri moških 42 primerov smrti in pri ženskah 54.

Nalezljive bolezni so kot vzrok smrti tokrat na devetem mestu med vsemi vzroki. Pri moških so vodilni vzroki smrti neoplazme, pri ženskah pa bolezni obtočil.

2.1. Tabela 5: **Umrli v povezavi s covidom-19, po spolu in starosti, Slovenija, 2024**

Starostno specifične stopnje umrljivosti, povezane s covidom-19, so bile najvišje v višjih starostnih skupinah, izrazito pa pri starosti 85 let in več.

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Slika 6: **Umrli v povezavi s covidom-19**, po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2023 in 2024

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

V letu 2024 je bilo **308 smrti povezanih s covidom-19**, kar je **350 smrti manj kot leta 2023** in **2.231 smrti manj kot leta 2022**. Več smrti povezanih s covidom-19 je bilo **pri moških**.

2.1. Tabela 6: *Umrli po vrsti poškodbe, zastrupitvah in nekaterih drugih posledicah zunanjih vzrokov (MKB-10, poglavje XIX) in po spolu, Slovenija, 2024*

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov po MKB-10		Število umrlih		SKUPAJ
		Moški	Ženske	
Poškodbe glave	S00–S09	123	79	202
Poškodbe vratu	S10–S19	17	8	25
Poškodbe prsnega koša	S20–S29	26	27	53
Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice	S30–S39	16	47	63
Poškodbe rame in nadlakti	S40–S49	2	1	3
Poškodbe komolca in podlakti	S50–S59	1	3	4
Poškodbe zapestja in roke	S60–S69	2	-	2
Poškodbe kolka in stegna	S70–S79	139	246	385
Poškodbe kolena in goleni	S80–S89	-	6	6
Poškodbe skočnega sklepa in stopala	S90–S99	-	1	1
Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij	T00–T07	158	90	248
Poškodbe na neopredeljenem delu trupa, uda ali telesnega področja	T08–T14	-	-	-
Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino	T15–T19	23	19	42
Opekline in korozije (kemične opekline)	T20–T32	2	4	6
Ozeblina	T33–T35	-	-	-
Zastrupitev z drogami, zdravili in biološkimi snovmi	T36–T50	48	37	85
Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora	T51–T65	45	13	58
Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov	T66–T78	168	42	210
Določeni zgodnji zapleti poškodbe	T79	-	-	-
Zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje	T80–T88	49	39	88
Kasne posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov	T90–T98	32	16	48
SKUPAJ		851	678	1.529

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 7: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti¹⁾ zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2024*

		SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev		
Poglavje MKB-10				SKUPAJ
Neoplazme	C00–D48	219,2	131,6	168,8
Bolezni obtočil	I00–I99	175,2	128,6	151,7
Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti	V01–Y98	60,6	26,2	42,8
Bolezni živčevja	G00–G99	25,7	24,1	24,8
Bolezni prebavil	K00–K93	24,8	12,9	18,8

© NIJZ


V Sloveniji, tako kot v drugih razvitih državah se stopnji dveh glavnih vzrokov smrti v zadnjih letih izenačujeta.

Glede na spol se vrstni red ni spremenil:

- **pri moških in pri ženskah** so na prvem mestu **neoplazme**

¹⁾ SSS umrljivosti - vse starostne skupine.

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Slika 7: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2015–2024*

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).


2.1. Tabela 8: *Umrli in stopnja umrljivosti po zunanjih vzrokih obolevnosti in umrljivost (MKB-10, poglavje XX) po spolu, Slovenija, 2024*

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivost po MKB-10		Število umrlih			Stopnja umrljivosti na 100.000 preb.		
		Moški	Ženske	SKUPAJ	Moški	Ženske	SKUPAJ
Pešec, poškodovan v transportni nezgodi	V01–V09	7	4	11	0,7	0,4	0,5
Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi	V10–V19	7	-	7	0,7	-	0,3
Motorist, poškodovan v transportni nezgodi	V20–V29	14	1	15	1,3	0,1	0,7
Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi	V30–V39	-	-	-	-	-	-
Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi	V40–V49	30	7	37	2,8	0,7	1,7
Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi	V50–V59	2	1	3	0,2	0,0	0,1
Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi	V70–V79	1	-	1	0,1	-	0,0
Druge nezgode med transportom po kopnem	V80–V89	14	1	15	1,3	0,1	0,7
Nezgode med transportom po vodi	V90–V94	1	-	1	0,1	-	0,0
Nezgode med transportom po zraku in v vesolju	V95–V97	2	1	3	0,2	0,1	0,1
Padci	W00–W19	370	468	838	34,6	44,3	39,4
Izpostavljenost neživim mehaničnim silam	W20–W49	18	5	23	1,7	0,5	1,1
Izpostavljenost živim mehaničnim silam	W50–W64	1	-	1	0,1	-	0,0
Naključna utopitev in potopitev	W65–W74	8	3	11	0,7	0,3	0,5
Druga naključna ogrožanja dihanja	W75–W84	27	21	48	2,5	2,0	2,3
Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju	W85–W99	3	-	3	0,3	-	0,1
Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom	X00–X09	3	1	4	0,3	0,0	0,2
Stik z vročino in vročimi snovmi	X10–X19	-	1	1	-	0,1	0,0
Izpostavljenost naravnim silam	X30–X39	17	7	24	1,6	0,7	1,1
Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi	X40–X49	14	8	22	1,3	0,8	1,0
Namerna samopoškodba	X60–X84	275	88	363	25,7	8,3	17,1
Napad	X85–Y09	7	6	13	0,7	0,6	0,6
Dogodek nedoločenega namena	Y10–Y34	19	3	22	1,8	0,0	1,0
Droge, zdravila in biološke snovi, uporabljene pri zdravljenju	Y40–Y59	14	19	33	1,3	1,8	1,6
Nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo	Y60–Y69	1	-	1	0,1	-	0,0
Kirurški, drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalno reakcijo ali kasnejši zaplet	Y83–Y84	48	38	86	4,5	3,6	4,0
Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti	Y85–Y89	30	16	46	2,8	1,5	2,2
SKUPAJ		933	699	1.632	87,2	66,2	76,8

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).



2.1. Tabela 9: **Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi padcev**¹⁾ po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2024



Z daljšanjem življenjske dobe se povečuje tudi število poškodb v višji starosti. Poškodbe so pretežno posledica padcev, zato so ti v zadnjih letih postali vzrok za največji delež smrti pri nezgodah.

V letu 2024 je zaradi posledic padcev umrlo 838 ljudi, 370 moških (35/100.000 moških) in 468 žensk (44/100.000 žensk).


¹⁾ Kode W00-W19 (MKB-10 klasifikacija).

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Padci


Usodni predvsem v višjih starostnih skupinah, pogostejši pri ženskah, kot pri moških.

51 % vseh smrti zaradi zunanjih vzrokov





2.1. Slika 8: **Stopnja umrljivosti zaradi samomorov¹⁾ (samomorilni količnik) po spolu, Slovenija, 2000–2024**




¹⁾ Kode X60–X84, X870 (MKB-10 klasifikacija).
Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

V letu 2024 je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 363 oseb, to je 5 oseb manj kot v predhodnem letu. Približno **trikrat več** je smrti zaradi **samomora moških (275) kot žensk (88)**.

Samorilni količnik se skozi leta bistveno ne spreminja, njegova vrednost je 17,1, kar je malenkost več kot v predhodnem letu.

2.1. Slika 9: **Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi samomorov¹⁾ po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2024**



¹⁾ Kode X60–X84, X870–W19 (MKB-10-AM klasifikacija).
Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Najvišje starostno specifične stopnje umrljivosti zaradi samomorov so v višjih starostnih skupinah prebivalstva.




REGIONALNE PRIMERJAVE

2.1. Tabela 10: *Umrli in stopnja umrljivosti po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024*

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Število umrlih														
SKUPAJ	Moški	747	1844	429	1350	330	442	715	2336	1023	327	658	572	10.773
	Ženske	730	1802	373	1371	333	395	749	2401	1006	304	645	624	10.733
	SKUPAJ	1.477	3.646	802	2.721	663	837	1.464	4.737	2.029	631	1.303	1.196	21.506
0–64 let	Moški	147	367	81	241	53	85	168	424	165	46	117	101	1.995
	Ženske	70	175	31	119	28	20	56	214	99	15	50	42	919
	SKUPAJ	217	542	112	360	81	105	224	638	264	61	167	143	2.914
Stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev														
SKUPAJ	Moški	1.320,0	1.099,1	1.199,1	1.011,1	1.150,4	1.147,4	943,6	833,0	971,2	1.168,9	1.098,3	959,2	1.006,9
	Ženske	1.281,6	1.106,5	1.073,9	1.063,4	1.168,1	1.056,1	1.033,1	838,4	965,9	1.165,2	1.107,8	1.046,1	1.016,0
	SKUPAJ	1.300,7	1.102,7	1.137,4	1.036,8	1.159,2	1.102,4	987,4	835,7	968,5	1.167,1	1.103,0	1.002,7	1.011,4
0–64 let	Moški	336,2	272,0	287,7	222,5	232,6	276,4	271,3	182,2	193,3	205,8	249,5	214,7	230,7
	Ženske	171,4	144,9	121,0	122,3	133,9	72,3	101,1	96,4	126,4	77,4	119,1	96,1	115,8
	SKUPAJ	256,6	212,0	208,3	175,1	185,4	179,7	191,0	140,3	161,3	146,1	187,9	157,6	175,7
Starostno standardizirana stopnja umrljivosti na 100.000 prebivalcev														
SKUPAJ	Moški	748,2	664,2	706,7	639,5	668,0	698,3	617,1	535,3	568,9	666,7	591,3	543,4	613,7
	Ženske	458,4	408,7	392,6	410,0	417,7	358,3	387,7	331,1	355,0	373,4	342,6	353,2	374,9
	SKUPAJ	595,5	527,9	536,7	515,0	533,0	515,5	499,1	422,3	450,6	508,3	461,2	443,3	484,8
0–64 let	Moški	246,1	205,9	214,4	171,4	165,3	207,8	214,1	155,8	162,4	157,8	188,1	154,3	181,9
	Ženske	124,5	104,6	85,2	91,3	89,7	54,3	76,5	80,5	98,1	58,1	87,6	71,4	88,4
	SKUPAJ	186,6	157,0	151,9	132,0	127,4	133,4	148,1	118,4	130,9	111,3	140,6	114,0	136,2

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Slika 10: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti** po statističnih regijah, Slovenija, 2024

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 11: **Umrli** po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
0–9 let	Moški	1	3	1	4	-	-	3	8	4	-	-	-	24
	Ženske	1	3	1	1	-	-	4	7	2	1	2	1	23
	SKUPAJ	2	6	2	5	-	-	7	15	6	1	2	1	47
10–19	Moški	2	4	1	1	-	-	1	8	5	-	-	-	22
	Ženske	1	-	-	2	-	-	1	-	3	-	1	1	9
	SKUPAJ	3	4	1	3	-	-	2	8	8	-	1	1	31
20–29	Moški	6	7	1	6	-	1	1	13	8	2	5	-	50
	Ženske	1	3	-	3	-	2	1	6	4	-	-	1	21
	SKUPAJ	7	10	1	9	-	3	2	19	12	2	5	1	71
30–39	Moški	7	23	5	12	3	6	15	22	13	4	8	4	122
	Ženske	4	13	-	5	-	1	1	10	5	-	1	4	44
	SKUPAJ	11	36	5	17	3	7	16	32	18	4	9	8	166
40–49	Moški	17	56	11	35	5	14	27	70	20	7	15	20	297
	Ženske	15	23	5	18	4	1	3	48	13	1	7	7	145
	SKUPAJ	32	79	16	53	9	15	30	118	33	8	22	27	442
50–59	Moški	61	130	30	78	18	34	57	158	57	14	45	35	717
	Ženske	28	57	16	44	13	8	24	68	28	6	18	12	322
	SKUPAJ	89	187	46	122	31	42	81	226	85	20	63	47	1.039
60–69	Moški	144	327	84	253	77	88	148	345	150	45	96	113	1.870
	Ženske	63	172	32	131	33	35	68	181	104	20	48	45	932
	SKUPAJ	207	499	116	384	110	123	216	526	254	65	144	158	2.802

Se nadaljuje na naslednji strani.








Nadaljevanje s prejšnje strani.

		Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
70-79	Moški	230	531	111	376	93	129	163	599	241	84	197	163	2.917
	Ženske	134	319	67	233	60	71	125	421	138	41	90	118	1.817
	SKUPAJ	364	850	178	609	153	200	288	1.020	379	125	287	281	4.734
80-89	Moški	237	579	140	454	101	124	211	766	364	126	203	157	3.462
	Ženske	303	713	156	556	116	160	277	871	365	130	261	252	4.160
	SKUPAJ	540	1.292	296	1.010	217	284	488	1.637	729	256	464	409	7.622
90+	Moški	42	184	45	131	33	46	89	347	161	45	89	80	1.292
	Ženske	180	499	96	378	107	117	245	789	344	105	217	183	3.260
	SKUPAJ	222	683	141	509	140	163	334	1.136	505	150	306	263	4.552

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Slika 11: **Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi nekaterih najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10 in statističnih regijah, Slovenija, 2024**

SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev

Neoplazme (C00–D48)**Bolezni obtočil (I00–I99)****Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti (V01–Y98)****Bolezni živčevja (G00–G99)****Bolezni prebavil (K00–K93)**

© NIJZ

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 12: **Umrli** po poglavjih MKB-10, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024

Poglavje MKB-10				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
I.	Nekatere infektivne in parazitarne bolezni	A00-B99	M	13	41	15	30	9	12	15	43	13	2	19	7	219
			Ž	20	34	8	35	8	14	22	39	12	5	8	16	221
		SKUPAJ		33	75	23	65	17	26	37	82	25	7	27	23	440
II.	Neoplazme	C00-D48	M	259	641	167	471	111	137	255	885	383	129	251	209	3.898
			Ž	196	494	110	357	97	114	194	801	295	60	185	173	3.076
		SKUPAJ		455	1.135	277	828	208	251	449	1.686	678	189	436	382	6.974
III.	Bolezni krvi in krvotvornih organov ter imunski odziv	D50-D89	M	2	2	-	2	1	1	-	3	2	-	-	1	14
			Ž	-	4	-	1	2	-	3	4	1	-	-	1	16
		SKUPAJ		2	6	-	3	3	1	3	7	3	-	-	2	30
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00-E90	M	7	31	13	27	8	9	12	46	18	7	8	9	195
			Ž	8	26	7	18	12	7	20	39	16	2	9	11	175
		SKUPAJ		15	57	20	45	20	16	32	85	34	9	17	20	370
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00-F99	M	29	77	11	44	22	17	35	84	33	9	26	28	415
			Ž	8	21	3	10	3	4	7	29	9	1	10	7	112
		SKUPAJ		37	98	14	54	25	21	42	113	42	10	36	35	527
VI.	Bolezni živčevja	G00-G99	M	34	72	13	56	12	19	32	110	49	15	27	35	474
			Ž	36	124	29	101	24	17	56	167	68	20	48	49	739
		SKUPAJ		70	196	42	157	36	36	88	277	117	35	75	84	1.213
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00-H59	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKUPAJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

Poglavje MKB-10			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60-H95	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKUPAJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Bolezni obtočil	I00-I99	M	221	562	130	446	102	147	194	678	311	88	202	156
			Ž	324	765	151	584	129	165	311	918	425	159	291	252
		SKUPAJ		545	1.327	281	1.030	231	312	505	1.596	736	247	493	408
X.	Bolezni dihal	J00-J99	M	36	89	15	69	15	19	26	79	45	19	26	20
			Ž	42	92	14	68	10	18	27	75	41	12	15	37
		SKUPAJ		78	181	29	137	25	37	53	154	86	31	41	57
XI.	Bolezni prebavil	K00-K93	M	46	87	18	58	14	22	31	59	35	9	17	22
			Ž	25	71	15	55	23	12	27	67	34	9	16	23
		SKUPAJ		71	158	33	113	37	34	58	126	69	18	33	45
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00-L99	M	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
			Ž	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		SKUPAJ		-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
XIII.	Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva	M00-M99	M	5	6	2	4	-	4	3	7	5	-	1	3
			Ž	4	19	2	6	1	1	6	17	7	2	4	7
		SKUPAJ		9	25	4	10	1	5	9	24	12	2	5	10
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00-N99	M	1	2	1	4	-	2	3	1	4	3	-	3
			Ž	5	10	2	11	1	2	4	13	6	-	1	2
		SKUPAJ		6	12	3	15	1	4	7	14	10	3	1	5

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

Poglavje MKB-10			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
XV. Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SKUPAJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	M	1	-	-	2	-	-	2	3	-	-	-	-	8
		Ž	-	2	-	1	-	-	3	3	2	-	-	-	11
	SKUPAJ		1	2	-	3	-	-	5	6	2	-	-	-	19
XVII. Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti	Q00–Q99	M	3	3	2	3	1	1	1	6	3	1	-	-	24
		Ž	1	2	1	1	-	-	-	2	-	1	3	-	11
	SKUPAJ		4	5	3	4	1	1	1	8	3	2	3	-	35
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. izvidi neuvrščeni drugje	R00–R99	M	19	69	12	41	12	18	30	124	26	10	20	33	414
		Ž	20	35	2	34	-	14	16	66	22	8	7	11	235
	SKUPAJ		39	104	14	75	12	32	46	190	48	18	27	44	649
XX. Zunanji vzroki obolenosti in umrljivosti	V01–Y98	M	71	162	29	93	23	34	76	207	96	35	61	46	933
		Ž	41	102	29	89	22	27	53	160	68	25	48	35	699
	SKUPAJ		112	264	58	182	45	61	129	367	164	60	109	81	1.632
SKUPAJ poglavja MKB-10		M	747	1.844	429	1.350	330	442	715	2.336	1.023	327	658	572	10.773
		Ž	730	1.802	373	1.371	333	395	749	2.401	1.006	304	645	624	10.733
SKUPAJ			1.477	3.646	802	2.721	663	837	1.464	4.737	2.029	631	1.303	1.196	21.506

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

2.1. Tabela 13: **Stopnja umrljivosti** po poglavjih MKB-10, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024

Na 100.000 prebivalcev

Na 100.000 prebivalcev																	
Poglavje MKB-10					Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
I.	Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni	A00–B99	M	23,0	24,4	41,9	22,5	31,4	31,2	19,8	15,3	12,3	7,1	31,7	11,7	20,5	
			Ž	35,1	20,9	23,0	27,1	28,1	37,4	30,3	13,6	11,5	19,2	13,7	26,8	20,9	
		SKUPAJ		29,1	22,7	32,6	24,8	29,7	34,2	25,0	14,5	11,9	12,9	22,9	19,3	20,7	
II.	Neoplazme	C00–D48	M	457,7	382,1	466,8	352,8	386,9	355,6	336,5	315,6	363,6	461,1	419,0	350,5	364,3	
			Ž	344,1	303,3	316,7	276,9	340,2	304,8	267,6	279,7	283,2	230,0	317,7	290,0	291,2	
		SKUPAJ		400,7	343,3	392,8	315,5	363,7	330,6	302,8	297,5	323,6	349,6	369,1	320,2	328,0	
III.	Bolezni krvi in org. ter imunski odziv	D50–D89	M	3,5	1,2	-	1,5	3,5	2,6	-	1,1	1,9	-	-	1,7	1,3	
			Ž	-	2,5	-	0,8	7,0	-	4,1	1,4	1,0	-	-	1,7	1,5	
		SKUPAJ		1,8	1,8	-	1,1	5,2	1,3	2,0	1,2	1,4	-	-	1,7	1,4	
IV.	Endokrine, prehranske in presnovne bolezni	E00–E90	M	12,4	18,5	36,3	20,2	27,9	23,4	15,8	16,4	17,1	25,0	13,4	15,1	18,2	
			Ž	14,0	16,0	20,2	14,0	42,1	18,7	27,6	13,6	15,4	7,7	15,5	18,4	16,6	
		SKUPAJ		13,2	17,2	28,4	17,1	35,0	21,1	21,6	15,0	16,2	16,6	14,4	16,8	17,4	
V.	Duševne in vedenjske motnje	F00–F99	M	51,2	45,9	30,7	33,0	76,7	44,1	46,2	30,0	31,3	32,2	43,4	47,0	38,8	
			Ž	14,0	12,9	8,6	7,8	10,5	10,7	9,7	10,1	8,6	3,8	17,2	11,7	10,6	
		SKUPAJ		32,6	29,6	19,9	20,6	43,7	27,7	28,3	19,9	20,0	18,5	30,5	29,3	24,8	
VI.	Bolezni živčevja	G00–G99	M	60,1	42,9	36,3	41,9	41,8	49,3	42,2	39,2	46,5	53,6	45,1	58,7	44,3	
			Ž	63,2	76,1	83,5	78,3	84,2	45,5	77,2	58,3	65,3	76,7	82,4	82,1	70,0	
		SKUPAJ		61,6	59,3	59,6	59,8	62,9	47,4	59,3	48,9	55,8	64,7	63,5	70,4	57,0	
VII.	Bolezni očesa in adneksov	H00–H59	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SKUPAJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII.	Bolezni ušesa in mastoida	H60–H95	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SKUPAJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

Na 100.000 prebivalcev

				Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
Poglavje MKB-10																
IX.	Bolezni obtočil	I00–I99	M	390,5	335,0	363,4	334,0	355,6	381,6	256,0	241,8	295,2	314,6	337,2	261,6	302,5
			Ž	568,8	469,7	434,7	453,0	452,5	441,2	429,0	320,6	408,0	609,4	499,8	422,5	423,5
		SKUPAJ		480,0	401,3	398,5	392,5	403,9	410,9	340,6	281,6	351,3	456,8	417,3	342,0	362,6
X.	Bolezni dihal	J00–J99	M	63,6	53,0	41,9	51,7	52,3	49,3	34,3	28,2	42,7	67,9	43,4	33,5	42,8
			Ž	73,7	56,5	40,3	52,7	35,1	48,1	37,2	26,2	39,4	46,0	25,8	62,0	42,7
		SKUPAJ		68,7	54,7	41,1	52,2	43,7	48,7	35,7	27,2	41,1	57,3	34,7	47,8	42,7
XI.	Bolezni prebavil	K00–K93	M	81,3	51,9	50,3	43,4	48,8	57,1	40,9	21,0	33,2	32,2	28,4	36,9	39,1
			Ž	43,9	43,6	43,2	42,7	80,7	32,1	37,2	23,4	32,6	34,5	27,5	38,6	35,7
		SKUPAJ		62,5	47,8	46,8	43,1	64,7	44,8	39,1	22,2	32,9	33,3	27,9	37,7	37,4
XII.	Bolezni kože in podkožja	L00–L99	M	-	-	2,8	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,2
			Ž	-	0,6	-	-	3,5	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3
		SKUPAJ		-	0,3	1,4	-	1,7	-	-	0,4	-	-	-	-	-
XIII.	Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva	M00–M9	M	8,8	3,6	5,6	3,0	-	10,4	4,0	2,5	4,7	-	1,7	5,0	3,7
			Ž	7,0	11,7	5,8	4,7	3,5	2,7	8,3	5,9	6,7	7,7	6,9	11,7	7,2
		SKUPAJ		7,9	7,6	5,7	3,8	1,7	6,6	6,1	4,2	5,7	3,7	4,2	8,4	5,5
XIV.	Bolezni sečil in spolovil	N00–N99	M	1,8	1,2	2,8	3,0	-	5,2	4,0	0,4	3,8	10,7	-	5,0	2,2
			Ž	8,8	6,1	5,8	8,5	3,5	5,3	5,5	4,5	5,8	-	1,7	3,4	5,4
		SKUPAJ		5,3	3,6	4,3	5,7	1,7	5,3	4,7	2,5	4,8	5,5	0,8	4,2	3,8
XV.	Nosečnost, porod in poporodno obdobje	O00–O99	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKUPAJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI.	Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju	P00–P96	M	1,8	-	-	1,5	-	-	2,6	1,1	-	-	-	-	0,7
			Ž	-	1,2	-	0,8	-	-	4,1	1,0	1,9	-	-	-	1,0
		SKUPAJ		0,9	0,6	-	1,1	-	-	3,4	1,1	1,0	-	-	-	0,9

Se nadaljuje na naslednji strani.



Nadaljevanje s prejšnje strani.

Na 100.000 prebivalcev


Poglavje MKB-10			Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Posavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Primorsko-notranjska	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
XVII. Prirojene malfor., in kromos. nenorm.	Q00–Q99	M	5,3	1,8	5,6	2,2	3,5	2,6	1,3	2,1	2,8	3,6	-	-	2,2
		Ž	1,8	1,2	2,9	0,8	-	-	-	0,7	-	3,8	5,2	-	1,0
	SKUPAJ		3,5	1,5	4,3	1,5	1,7	1,3	0,7	1,4	1,4	3,7	2,5	-	1,6
XVIII. Simptomi, znaki, izvidi, neuvrščeni	R00–R99	M	33,6	41,1	33,5	30,7	41,8	46,7	39,6	44,2	24,7	35,7	33,4	55,3	38,7
		Ž	35,1	21,5	5,8	26,4	-	37,4	22,1	23,0	21,1	30,7	12,0	18,4	22,2
	SKUPAJ		34,3	31,5	19,9	28,6	21,0	42,1	31,0	33,5	22,9	33,3	22,9	36,9	30,5
XX. Zunanji vzroki obolev. in umrljivosti	V01–Y98	M	125,5	96,6	81,1	69,7	80,2	88,3	100,3	73,8	91,1	125,1	101,8	77,1	87,2
		Ž	72,0	62,6	83,5	69,0	77,2	72,2	73,1	55,9	65,3	95,8	82,4	58,7	66,2
	SKUPAJ		98,6	79,8	82,3	69,3	78,7	80,3	87,0	64,7	78,3	111,0	92,3	67,9	76,8
SKUPAJ poglavja	MKB–10	M	1.320,0	1.099,1	1.199,1	1.011,1	1.150,4	1.147,4	943,6	833,0	971,2	1.168,9	1.098,3	959,2	1.006,9
		Ž	1.290,0	1.106,5	1.073,9	1.063,4	1.168,1	1.056,1	1.033,1	838,4	965,9	1.165,2	1.107,8	1.046,1	1.016,0
	SKUPAJ		1.300,7	1.102,7	1.137,4	1.036,8	1.159,2	1.102,4	987,4	835,7	968,5	1.167,1	1.103,0	1.002,7	1.011,4

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

V Sloveniji je bila stopnja umrljivosti v letu 2024 najvišja zaradi bolezni obtočil, 363 na 100.000 prebivalcev. Najvišja stopnja je v pomurski regiji (480 na 100.000 prebivalcev) in najnižja v osrednjeslovenski regiji (282 na 100.000 prebivalcev).

2.1. Slika 12: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni obtočil (I00-I99) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2015–2024*


SSS umrljivosti na 100.000 prebivalcev



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).




2.1. Slika 13: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi neoplazem (C00–D48) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2015–2024



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).



2.1. Tabela 14: **Umrli in stopnja umrljivosti v povezavi covid-19, po spolu, starosti in statističnih regijah, Slovenija, 2024**



Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Stopnja umrljivosti v povezavi s covid-19 je pri moških višja kot pri ženskah.

Najvišjo stopnjo umrljivosti v povezavi s covid-19 smo v letu 2024 beležili v koroški regiji (30 na 100.000 prebivalcev), **najnižjo stopnjo** pa v gorenjski regiji (5 na 100.000 prebivalcev).



2.1. Tabela 15: **Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti¹⁾** (MKB-10, poglavje XX), po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024



© NIJZ

¹⁾ Kode V01–Y98 (MKB-10 klasifikacija).

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Stopnja umrljivosti zaradi zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti je:

- **najvišja** v primorsko-notranjski regiji in
- **najnižja** v osrednjeslovenski regiji.

2.1. Tabela 16: **Stopnja umrljivosti zaradi samomorov¹⁾** (samomorilni količnik) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024




© NIJZ

¹⁾ Kode X60–X84, X870 (MKB-10 klasifikacija).

Viri: Zdravniško poročilo o umrli osebi (NIJZ 46).

Stopnja umrljivosti zaradi samomorov je bila v letu 2024 **najvišja pomurski regiji**, sledi ji **gorenjska regija**.


Tako v razvitih državah kot tudi v Sloveniji je **samomor med moškimi pogostejši kot med ženskami**.

2.1. Slika 14: **Stopnja umrljivosti zaradi samomorov¹⁾ (samomorilni količnik) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2015–2024**¹⁾ Kode X60–X84, X870 (MKB-10-AM klasifikacija).²⁾ Ni primera za leto 2022 pri ženskah.³⁾ Ni primera za leto 2015, 2019 in 2023 pri ženskah.



MEDNARODNE PRIMERJAVE

2.1. Slika 15: *Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi vseh vzrokov smrti, po spolu, Slovenija in EU, 1985–2020*



Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi vseh vzrokov smrti, kjer so v ospredju predvsem najpogostejši:

- **bolezni srca in ožilja,**
- **neoplazme ter**
- **zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti,**

se je v Sloveniji povsem približala stopnji v EU, tako za moške kot za ženske.

Pri ženskah je razlika manjša, kot pri moških.

Viri: WHO European Data Warehouse, <https://dw.euro.who.int>, 18. 11. 2025; podatki na sliki so isti kot v Zdravstvenem statističnem letopisu Slovenije 2023.



DEFINICIJE

NAZIV	OKRAJŠAVA	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Mediana starosti ob smrti	MS	Mediana starosti ob smrti predstavlja srednjo vrednost starosti ob smrti, od katere ima polovica umrlih nižjo in polovica umrlih višjo vrednost starosti ob smrti.	Mediana starosti ob smrti = srednja vrednost starosti umrlih ob smrti	Median age at death
Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, X. revizija	MKB-10	MKB je klasifikacija bolezni, kot jih razvršča WHO. Klasifikacija bolezni je sistem kategorij, v katerega so bolezni in stanja uvrščeni v skladu z izbranimi merili. S pomočjo MKB lahko diagnoze bolezni in drugih zdravstvenih težav prevedemo iz besednega opisa v črkovno-številčne kode. Po letu 1996 so vzroki smrti razvrščeni po MKB-10.	MKB-10 je razdeljena na 21 poglavij. Prvi znak vsake kode je črka in vsaka črka je povezana z določenim poglavjem, razen črke D (poglavji II in III) in črke H (poglavji VII in VIII). V štirih poglavjih (I, II, XIX in XX) se na prvem mestu kod pojavlja več različnih črk. Črki sledi trimestna kategorija (ali štirimestna podkategorija) številskega znaka. Poglavja I do XVII se nanašajo na bolezni in druga bolezenska stanja, poglavje XIX pa na poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov. V poglavju XVIII so simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje, v poglavju XX so zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti, v poglavju XXI pa dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in stike z zdravstveno službo.	ICD-10, International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision
Nasilna smrt		Nasilna smrt je tista, ki je posledica nezgode (vse vrste prometnih nezgod, naključni padci, utopitve, nesreče z ognjem, orožjem itd.), samomora ali uboja.	Nasilna smrt je posledica delovanja različnih zunanjih dejavnikov.	Violent death
Prezgodnja umrljivost		Prezgodnja umrljivost je opredeljena kot smrt oseb, ki umrejo v starosti pred dogovorjeno mejo 65 let.	Starostna meja za prezgodnjo smrt je 64,99 let in je določena dogovorno. Stopnje so izračunane na 100.000 prebivalcev, starih od 0 do 64,99 let.	Premature mortality
Samomor		Samomor ali suicide je dejanje, s katerim človek sam namerno povzroči svojo smrt oziroma si vzame življenje.		Suicide
Samomorilni količnik		Je razmerje med številom umrlih zaradi samomora v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 100.000. Pri izračunu umrljivosti zaradi samomora so upoštevane kode X60–X84, X870 MKB-10-AM klasifikacije.	$(\text{Število umrlih zaradi samomora} / \text{število prebivalcev}) * 100.000$	Suicide rate



NAZIV	OKRAJŠAVA	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Smrt zaradi covid-19		Smrt zaradi covid-19 je v teh smernicah opredeljena kot smrt, ki je posledica bolezni covid-19, razen če obstaja jasen alternativni vzrok smrti, ki ga ni mogoče povezati z boleznijo covid-19 (travma, akutni miokardni infarkt). Pri tem velja poudariti, da pozitiven test na SARS-CoV-2 ni nujen pogoj za določitev covid-19 kot osnovnega vzroka smrti, ker je bistven zapis mrliškega preglednika na zdravniškem potrdilu o smrti in poročilu o vzrokih smrti in obdukcijski zapisnik, če obstaja. Zabeležen covid-19 kot osnovni vzrok smrti na zdravniškem potrdilu o smrti in poročilu o vzrokih smrti smo ob odsotnosti pozitivnega testa na SARS-CoV-2 dodatno preverjali še v zbirki Spremljanje bolnišničnih obravnav.	Natančneje opredeljena pojasnila glede števila umrlih v povezavi s covid-19 so objavljena na spletni strani NIJZ: https://podatki.nijz.si/docs/Razlike_umrli_covid.pdf.	Covid related deaths
Starostno specifična stopnja umrljivosti		Starostno specifična stopnja umrljivosti je razmerje med številom umrlih določene starosti v koledarskem letu in številom prebivalstva enake starosti sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 100.000.	Starostno specifična stopnja umrljivosti = (število umrlih oseb določene starosti x 100.000) / število prebivalcev iste starosti	Age-specific mortality rate
Starostno standardizirana stopnja umrljivosti	SSS	Starostno standardizirana stopnja umrljivosti (ang. standardized death rate – SDR) je metoda direktne standardizacije, kjer se izračun stopnje umrljivosti na 100.000 prebivalcev, razdeljen po petletnih starostnih skupinah, umeri s preračunom na standardno populacijo, kar izniči razlike v populaciji glede starosti prebivalstva posameznih držav/regij/teritorija. Ta postopek omogoči neposredno primerjavo stopenj umrljivosti po posameznih državah, ne glede na razlike v starostni strukturi prebivalstva posamezne države.	Pri izračunu SSS se uporablja Evropska standardna populacija (ESP) Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 1976. Več informacij: http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/03/WHO-Standard-Population.pdf .	Standardized death rate
Stopnja umrljivosti		Stopnja umrljivosti je razmerje med številom umrlih v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 100.000.	Stopnja umrljivosti = (število umrlih x 100.000) / število prebivalcev	Death rate
Umrli		Umrli je oseba, pri kateri so kadar koli, potem ko je bila živorojena, trajno prenehale vse življenjske funkcije.	Podatki o umrlih beležijo umrle s stalnim prebivališčem v RS, ki so umrli od 1. januarja do 31. decembra v opazovanem koledarskem letu. V RS smrt potrdijo in vzroke smrti ugotavljajo samo zdravniki. Ob mrliškem pregledu so dolžni izpisati zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzrokih smrti na način, ki ga je predpisala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Podrobnejša metodološka pojasnila so objavljena na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Deceased / Dead person



NAZIV	OKRAJŠAVA	DEFINICIJA	DODATNA POJASNILA	ANGL. IZRAZ
Umrli dojenček		Umrli dojenček je otrok, pri katerem so, kadar koli potem ko je bil živorojen, trajno prenehale vse življenjske funkcije in še ni dopolnil enega leta starosti.	Dodatna metodološka pojasnila na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/ .	Infant death
Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih		Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov (0–365 dni) in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	Umrljivost dojenčkov = (število umrlih dojenčkov × 1.000) / število živorojenih otrok	Infant mortality or infant deaths per 1000 live births
Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih		Umrljivost dojenčkov ali umrli dojenčki na 1.000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov (0–365 dni) in številom živorojenih v istem koledarskem letu, pomnoženo s 1.000.	Umrljivost dojenčkov = (število umrlih dojenčkov × 1.000) / število živorojenih otrok	Infant mortality or infant deaths per 1000 live births
Vzroki smrti		Vzroki smrti so vse bolezni, bolezenska stanja ali poškodbe, ki so povzročile smrt ali so privedle do smrti, in okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile take poškodbe. Vzroke smrti se kodira po enotni doktrini, predpisani v deseti reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10).	Osnovni vzrok smrti je/so: bolezen ali poškodba, ki je sprožila bolezenske ali poškodbene dogodke, ki so neposredno privedli do smrti, ali okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile poškodbo, zaradi katere je oseba umrla.	Causes of death
Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti		Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti so okoliščine ali nasilje, ki je povzročilo poškodbo (ali stanje), zaradi katere je oseba umrla.	Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti se od MKB-9 dalje lahko dodatno kodirajo tudi k drugim boleznim in bolezenskim stanjem, ne samo k poškodbam in zastrupitvam, kot so se morali pri vseh prejšnjih revizijah. Zato je vzrokov smrti v poglavju XIX manj kot zunanjih vzrokov v poglavju XX.	External causes of mortality



SEZNAM SLIK

2.1. Slika 1: Vodilna vzroka smrti po spolu, Slovenija, 2015–2024	2
2.1. Slika 2: Povprečna starost ob smrti po spolu, Slovenija, 1990–2024	4
2.1. Slika 3: Povprečna starost ob smrti po spolu, Slovenija, 2004 in odmik 2004/1995, 2014 in odmik 2014/2005, 2024 in odmik 2024/2015	4
2.1. Slika 4: Umrli dojenčki po spolu, Slovenija, 1985–2024	6
2.1. Slika 5: Umrli, 0–64 let po spolu, Slovenija, 2015–2024	8
2.1. Slika 6: Umrli v povezavi s covidom-19 , po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, 2023 in 2024	11
2.1. Slika 7: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2015–2024	13
2.1. Slika 8: Stopnja umrljivosti zaradi samomorov¹⁾ (samomorilni količnik) po spolu, Slovenija, 2000–2024	16
2.1. Slika 9: Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi samomorov¹⁾ po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2024	16
2.1. Slika 10: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti po statističnih regijah, Slovenija, 2024	18
2.1. Slika 11: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi nekaterih najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10 in statističnih regijah, Slovenija, 2024	21
2.1. Slika 12: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi bolezni obtočil (I00-I99) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2015–2024	28
2.1. Slika 13: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi neoplazem (C00–D48) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2015–2024	29
2.1. Slika 14: Stopnja umrljivosti zaradi samomorov¹⁾ (samomorilni količnik) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2015–2024	32
2.1. Slika 15: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi vseh vzrokov smrti , po spolu, Slovenija in EU, 1985–2020	33



SEZNAM TABEL

2.1. Tabela 1: Umrli in stopnja umrljivosti po spolu, Slovenija, 2015–2024.....	5
2.1. Tabela 2: Umrli dojenčki po spolu, Slovenija, 2015–2024.....	6
2.1. Tabela 3: Umrli po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2024	7
2.1. Tabela 4: Umrli in stopnja umrljivosti po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2024.....	9
2.1. Tabela 5: Umrli v povezavi s covidom-19 , po spolu in starosti, Slovenija, 2024	10
2.1. Tabela 6: Umrli po vrsti poškodbe, zastrupitvah in nekaterih drugih posledicah zunanjih vzrokov (MKB-10, poglavje XIX) in po spolu , Slovenija, 2024.....	12
2.1. Tabela 7: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti¹⁾ zaradi najpogostejših vzrokov smrti po poglavjih MKB-10 in spolu, Slovenija, 2024	13
2.1. Tabela 8: Umrli in stopnja umrljivosti po zunanjih vzrokih obolevnosti in umrljivost (MKB-10, poglavje XX) po spolu, Slovenija, 2024	14
2.1. Tabela 9: Starostno specifična stopnja umrljivosti zaradi padcev¹⁾ po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2024	15
2.1. Tabela 10: Umrli in stopnja umrljivosti po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024.....	17
2.1. Tabela 11: Umrli po starostnih skupinah, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024	19
2.1. Tabela 12: Umrli po poglavjih MKB-10, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024.....	22
2.1. Tabela 13: Stopnja umrljivosti po poglavjih MKB-10, spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024.....	25
2.1. Tabela 14: Umrli in stopnja umrljivosti v povezavi covid-19 , po spolu, starosti in statističnih regijah, Slovenija, 2024	30
2.1. Tabela 15: Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti¹⁾ (MKB-10, poglavje XX), po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024	31
2.1. Tabela 16: Stopnja umrljivosti zaradi samomorov¹⁾ (samomorilni količnik) po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2024.....	31