

Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrtno poročilo, 1. julij – 30. september 2025

V obdobju od 1. julija do 30. septembra 2025 je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih (1) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **634 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 370 pri moških in 264 pri ženskah.

Prijavljenih je bilo 131 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe (75 pri moških in 56 pri ženskah). Od tega je bilo pet primerov veneričnega limfogranuloma med moškimi, ki so imeli spolne odnose z moškimi (MSM). Prijavljenih je bilo 82 primerov gonoreje (72 pri moških in 10 pri ženskah), 33 primerov zgodnjega sifilisa (29 pri moških in štiri pri ženskah) in trije primeri neopredeljenega sifilisa (dva pri moških in en pri ženski). Med ostalimi prijavljenimi SPO po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo 177 primerov genitalnih bradavic, 136 primerov genitalnega herpesa, 41 primerov nespecifičnega uretritisa, 24 primerov neopredeljene SPO, med katerimi je bila pri enem primeru dokazana okužba z urogenitalnimi mikoplazmami, štiri primeri trihomonoze in trije primeri izcedka iz sečnice moškega.

Med 72 prijavljenimi primeri gonoreje pri moških je bilo 47 primerov med MSM. Med 29 prijavljenimi primeri zgodnjega sifilisa pri moških je bilo 15 primerov med MSM.

Skupaj so 44 % primerov SPO prijavili dermatovenerologi, po 20 % primerov ginekologi in specialisti splošne medicine, 6 % primerov infektologi, 2 % primerov mikrobiologi in po 1 % primerov urologi, epidemiologi, pediatri, specialisti urgentne medicine in laboratoriji. Po en primer so prijavili specialist medicine, dela in športa, psihiater, kirurg, transfuziolog in specializantka ginekologija in porodništva. Za dva odstotka primerov podatek o prijavitelju ni bil na voljo.

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenca SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj pogostosti teh okužb med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavni incidenci SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

Večje število prijavljenih primerov SPO v primerjavi s preteklimi četrtni je najverjetneje posledica vzpostavitve poenotene Elektronske prijavnice za poročanje SPO, ki se je začela uporabljati s 16. junijem 2025. Elektronska prijavnica naj bi v prihodnje nadomestila papirni obrazec za prijavo SPO ter računalniške izpise iz informacijskih sistemov izvajalcev, ki so jih prej pošiljali na NIJZ. Papirni obrazec ostaja v uporabi pri izvajalcih, ki še ne uporabljajo elektronske prijavnice za NB.

V **Tabeli 1** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. julija do 30. septembra 2025.

V **Tabeli 2** je prikazano število prijavljenih primerov in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. julija do 30. septembra 2025.

Tabela 1: Število prijavljenih primerov in prijave incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji, 1. julij – 30. september 2025

Regija bivanja	Spol	Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba	
		Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000
Celje	ženska	1	0,7	2	1,3	7	4,6
	moški	3	1,9	7	4,4	7	4,4
	skupaj	4	1,3	9	2,9	14	4,5
Nova Gorica	ženska	0	0,0	1	2,0	1	2,0
	moški	1	1,9	4	7,7	0	0,0
	skupaj	1	1,0	5	4,9	1	1,0
Koper	ženska	0	0,0	2	2,6	5	6,4
	moški	2	2,5	3	3,8	5	6,3
	skupaj	2	1,3	5	3,2	10	6,4
Kranj	ženska	0	0,0	0	0,0	7	6,7
	moški	8	7,6	6	5,7	7	6,6
	skupaj	8	3,8	6	2,9	14*	6,7
Ljubljana	ženska	2	0,6	1	0,3	27	7,8
	moški	6	1,8	35	10,2	39	11,4
	skupaj	8	1,2	36	5,2	66*	9,6
Maribor	ženska	1	0,6	1	0,6	3	1,8
	moški	6	3,6	7	4,2	7	4,2
	skupaj	7	2,1	8	2,4	10	3,0
Murska Sobota	ženska	0	0,0	2	3,5	1	1,8
	moški	0	0,0	1	1,8	1	1,8
	skupaj	0	0,0	3	2,7	2	1,8
Novo mesto	ženska	0	0,0	0	0,0	4	5,6
	moški	2	2,7	5	6,6	1	1,3
	skupaj	2	1,4	5	3,4	5	3,4
Ravne	ženska	0	0,0	0	0,0	1	2,9
	moški	1	2,8	3	8,4	6	16,8
	skupaj	1	1,4	3	4,3	7*	9,9
Neznana/tujina	ženska	0	-	1	-	0	-
	moški	0	-	1	-	2	-
	skupaj	0	-	2	-	2	-
Skupaj	ženska	4	-	10	-	56	-
	moški	29	-	72	-	75	-
	skupaj	33	-	82	-	131	-

Vir: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (NIJZ 53), 4. 12. 2025.

* Med klamidijskimi okužbami je bilo prijavljenih pet primerov LGV (po en primer v kranjski in ravenski regiji in trije primeri v ljubljanski regiji).

Tabela 2: Število prijavljenih primerov in prijave incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji, 1. julij – 30. september 2025

Starostna skupina (v letih)	Spol	Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba	
		Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000	Število	Št. na 100.000
<15	ženska	0	0,0	0	0,0	1	0,7
	moški	0	0,0	0	0,0	1	0,6
	skupaj	0	0,0	0	0,0	2	0,6
15-19	ženska	0	0,0	0	0,0	1	1,9
	moški	1	1,8	3	5,4	3	5,4
	skupaj	1	0,9	3	2,8	4	3,7
20-24	ženska	1	2,0	2	4,1	23	47,0
	moški	2	3,6	6	10,9	12	21,9
	skupaj	3	2,9	8	7,7	35	33,7
25-29	ženska	0	0,0	2	3,9	13	25,5
	moški	5	8,3	12	19,9	26	43,1
	skupaj	5	4,5	14	12,6	39*	35,0
30-34	ženska	2	3,6	1	1,8	4	7,2
	moški	4	6,2	18	28,1	11	17,2
	skupaj	6	5,0	19	15,9	15*	12,6
35-44	ženska	1	0,7	2	1,4	11	7,9
	moški	11	7,0	24	15,2	16	10,1
	skupaj	12	4,0	26	8,7	27*	9,1
45-64	ženska	0	0,0	3	1,0	3	1,0
	moški	6	1,9	9	2,9	6	1,9
	skupaj	6	1,0	12	2,0	9*	1,5
≥65	ženska	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	skupaj	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Skupaj	ženska	4		10		56	
	moški	29		72		75	
	skupaj	33		82		131	

Vir: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (NIJZ 53), 4. 12. 2025.

* Med klamidijskimi okužbami je bilo prijavljenih pet primerov LGV (po en primer v starostnih skupinah 25-29, 30-34 in 45-64 let in dva primera v starostni skupini 35-44 let).

Med prijavljenimi primeri klamidijskih okužb pri osebah, mlajših od 15 let, je v enem primeru šlo za novorojenega otroka s klamidijsko okužbo očesne veznice in v enem primeru za mladostnico, staro 14 let.

Izčrpnejši podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v letnem poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji v letu 2024« (2).

REFERENCI

- 1) Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22) [citirano 12. 12. 2025]. Dostopno na: <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433>
- 2) Klavs I, Berlot L, Kustec T, Avsec M, Kunšič N, Učakar V, et al. Spolno prenesene okužbe v Sloveniji v letu 2024 [Internet]. Spolno prenesene okužbe v Sloveniji. 2025:1-24 [citirano 12. 12. 2025]. Dostopno na: <https://nijz.si/publikacije/spolno-prenesene-okuzbe-v-sloveniji-v-letu-2024/>