

Epidemiološko spremljanje hudo potekajočih akutnih okužb dihal (v angl.: severe acute respiratory infection – SARI) v slovenskih bolnišnicah (EPISARI)

Rezultati za zadnje štiri opazovane tedne od 17. 8. 2026 do 13. 9. 2026

Datum objave: 18. 09. 2026

V nacionalno mrežo za epidemiološko spremljanje hudo potekajočih akutnih okužb dihal (v angl.: severe acute respiratory infection – SARI), EPISARI mrežo, ki jo koordiniramo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je vključenih 14 slovenskih bolnišnic, ki so v skladu z veljavno zakonodajo zavezane k poročanju podatkov: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni klinični center Maribor, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica Novo mesto, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Trbovlje, Bolnišnica Topolšica in Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik. V EPISARI mrežo so vključene tudi Bolnišnica Sežana, Onkološki inštitut Ljubljana, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Bolnišnica za otroke - Šentvid pri Stični, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Psihiatrična bolnišnica Idrija, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Diagnostični center Bled, Kirurški sanatorij Rožna dolina in MC Medicor, ki podatke prispevajo le, v kolikor bi začele sprejemati paciente s SARI.

Odgovorne osebe za posredovanje podatkov EPISARI v posameznih bolnišnicah do vsake srede posredujejo podatke EPISARI za pretekli teden. V kolikor podatke ali popravke podatkov iz posameznih bolnišnic prejmemo kasneje, ustrezno dopolnimo oziroma popravimo zadnje objavljeno poročilo EPISARI.

Podatki EPISARI nam omogočajo tedensko spremljanje spreminjanja pogostosti (incidence) hude obolevnosti zaradi okužbe s SARS-CoV-2, okužbe z virusi influence in okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) v Sloveniji, torej pogostosti tako hudo potekajočih akutnih okužb dihal, da zahtevajo sprejem v bolnišnico. Tako zaznamo porast in upadanje števila tako hudo potekajoče bolezni covid-19, gripe ali okužbe z RSV, ki zahteva sprejem v bolnišnico.

V zadnjem opazovanem tednu od 7. 9. do 13. 9. 2026 je bilo v 6 od 14 slovenskih bolnišnic, ki sprejemajo SARI paciente, s skupno 1646 bolnišničnimi posteljami, sprejetih 42 pacientov zaradi SARI (2,6/100 bolniških postelj). Med njimi je bil en pacient sprejet z mikrobiološko potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 (0,1/100 bolniških postelj) in dva pacienta z mikrobiološko potrjeno okužbo z virusom influence A (0,1/100 bolniških postelj). V bolnišnice ni bil sprejet noben pacient z mikrobiološko potrjeno okužbo z RSV. Med pacienti, ki so bili sprejeti zaradi SARI, ni bil v enote intenzivnega zdravljenja (EIZ) sprejet noben pacient s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, virusom influence ali RSV. Med pacienti, ki so bili sprejeti zaradi SARI, ni umrl noben pacient z mikrobiološko potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2, influence ali RSV.

V naslednji tabeli prikazujemo spreminjanje števila sprejetih pacientov v bolnišnice zaradi hudo potekajoče akutne okužbe dihal (SARI) in število sprejetih pacientov v bolnišnice, število sprejemov v bolnišnice na 100 bolniških postelj, število sprejemov v EIZ ter število umrlih zaradi SARI s potrditvijo virusnih okužb s SARS-CoV-2, z virusi influence in RSV za zadnje štiri opazovane tedne.

Število sprejetih pacientov v bolnišnico zaradi SARI, število sprejetih v EIZ, ki so bili sprejeti zaradi SARI, in število umrlih, ki so bili sprejeti zaradi SARI, s potrditvijo naslednjih virusnih okužb:																				
Opazovani teden	Število sodelujočih bolnišnic	Skupno število bolniških postelj	Število pacientov, sprejetih zaradi SARI v bolnišnico		SARS-CoV-2 ¹				Influenca tipa A ²				Influenca tipa B ³				RSV ⁴			
			Sprejeti v bolnišnico	Število sprejemov na 100 bolniških postelj	Sprejeti v bolnišnico	Število sprejemov na 100 bolniških postelj	Sprejeti v EIZ	Umrli v bolnišnici	Sprejeti v bolnišnico	Število sprejemov na 100 bolniških postelj	Sprejeti v EIZ	Umrli v bolnišnici	Sprejeti v bolnišnico	Število sprejemov na 100 bolniških postelj	Sprejeti v EIZ	Umrli v bolnišnici	Sprejeti v bolnišnico	Število sprejemov na 100 bolniških postelj	Sprejeti v EIZ	Umrli v bolnišnici
17.8.-23.8.2026	7	2003	40	2,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	1	0,0	0	0
24.8.-30.8.2026	7	2003	36	1,8	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
31.8.-6.9.2026	7	2003	48	2,4	1	0,0	1	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
7.9.-13.9.2026	6	1646	42	2,6	1	0,1	0	0	2	0,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0

Skupno število bolniških postelj: skupno število bolniških postelj v sodelujočih bolnišnicah (podatek za leto 2025 iz Poročila o delu stacionarnega zavoda (Obr. št. 3-21-60))

SARI: hudo potekajoča akutna okužba dihal, ki zahteva hospitalizacijo. EIZ: enota(e) intenzivnega zdravljenja. RSV: respiratorni sincicijski virus.

- 1: Število pacientov s potrditvijo virusa SARS-CoV-2, če je bil rezultat testiranja na voljo do dneva poročanja v naslednjem tednu.
- 2: Število pacientov s potrditvijo virusa influence A, če je bil rezultat testiranja na voljo do dneva poročanja v naslednjem tednu.
- 3: Število pacientov s potrditvijo virusa influence B, če je bil rezultat testiranja na voljo do dneva poročanja v naslednjem tednu.
- 4: Število pacientov s potrditvijo virusa RSV, če je bil rezultat testiranja na voljo do dneva poročanja v naslednjem tednu.

Za potrditev virusnih okužb s SARS-CoV-2, virusom influence A, virusom influence B ali RSV mora biti izpolnjen vsaj eden od naslednjih kriterijev:

- odkritje nukleinske kisline virusa v kliničnem vzorcu,
- identifikacija antigena virusa v kliničnem vzorcu (če so antigeni testi uporabljeni in so jih izvedli za tako testiranje usposobljeni zdravstveni delavci) ali
- osamitev virusa iz kliničnega vzorca.

V naslednjih tabelah prikazujemo spreminjanje števila sprejetih pacientov v bolnišnice zaradi SARI s potrditvijo različnih virusnih okužb za zadnje štiri opazovane tedne po starostnih skupinah.

Sprejeti SARI s potrditvijo SARS-CoV-2 v bolnišnice po starostnih skupinah, za zadnje 4 tedne

Opazovani teden	Število bolnišnic	Skupaj	Starost v letih									
			0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
17.8.-23.8.2026	7	0										
24.8.-30.8.2026	7	0										
31.8.-6.9.2026	7	1						1				
7.9.-13.9.2026	6	1				1						
Skupaj		2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

Sprejeti SARI s potrditvijo virusa gripe A v bolnišnice po starostnih skupinah, za zadnje 4 tedne

Opazovani teden	Število bolnišnic	Skupaj	Starost v letih									
			0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
17.8.-23.8.2026	7	0										
24.8.-30.8.2026	7	0										
31.8.-6.9.2026	7	0										
7.9.-13.9.2026	6	2			1						1	
Skupaj	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

Sprejeti SARI s potrditvijo virusa gripe B v bolnišnice po starostnih skupinah, za zadnje 4 tedne

[illegible]

Sprejeti SARI s potrditvijo RSV v bolnišnice po starostnih skupinah, za zadnje 4 tedne

[illegible]