NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje

24.11.2026

Redna cepljenja in zaščita otrok in odraslih ter cepljenje in zaščita zamudnikov v skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2026 (tabelarični prikaz)

Tabela 1: Cepljenje šolskih in predšolskih otrok – redna cepljenja in zamudniki [$]

CEPIVO	OBIČAJNA SHEMA CEPLJENJA	SHEME CEPLJENJA ZAMUDNIKOV	ZAMUDNIKI* (STAROSTNE MEJE)
Davica, tetanus, oslovski kašelj, hemofilus influence tip b, otroška paraliza, hepatitis B	• prvi odmerek: 3 mesece • drugi odmerek: 5 mesecev • tretji odmerek: 11-18 mesecev	• 3 odmerki (0,2,8)	• Do dopolnjenega 5. leta starosti
Davica, tetanus (Di/Te)	/	• Prvi in drugi odmerek Di/Te; tretji odmerek Di/Te/Per (0,1,6) • Poživitveni odmerki v skladu s programom cepljenja	• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti
Davica, tetanus, oslovski kašelj (Di/Te/Per)[**]	• poživitveni odmerek: 2. razred OŠ in v srednji šoli		
Otroška paraliza	/	• 3 odmerki (0,1,6)	• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti
Hepatitis B (otroci, cepljeni s petvalentnim cepivom)	• tretji odmerek: 2. razred (za otroke, rojene pred oktobrom 2019)	• 3 odmerki (0,1,6)	• Od 5. leta do dopolnjenega 26. leta starosti
Ošpice, mumps, rdečke, norice[$$]	• prvi odmerek: 11-18 mesecev • drugi odmerek: 3 leta	• 2 odmerka (0,1)	• Do dopolnjenega 26. leta starosti
Pnevmokokne okužbe (20-valentno cepivo)	• prvi odmerek: 3 mesece • drugi odmerek: 5 mesecev • tretji odmerek: 6 mesecev • poživitveni odmerek: 11-18 mesecev	• 7-11 mesecev: 3 odmerki (drugi odmerek 4 tedne po prvem; tretji odmerek v drugem letu starosti in vsaj 8 tednov po drugem odmerku) • 12-23 mesecev: 2 odmerka (0,2) • 2-5 let: 1 odmerek	• Do dopolnjenega 5. leta starosti
Klopni meningoencefalitis (KME)[#]	• prvi odmerek: po dopolnjenem enem letu starosti • drugi odmerek: 1-3 mesece ali 14 dni (hitra shema) po prvem odmerku • tretji odmerek: 5-12 mesecev po drugem odmerku • poživitveni odmerki na 3 oz. 5 let	• 3 odmerki (drugi odmerek 1-3 mesece ali 14 dni (hitra shema) po prvem, tretji odmerek 5-12 mesecev po drugem odmerku) • poživitveni odmerki na 3 oz. 5 let	• Rojeni leta 2016 ali kasneje[##]
Humani papilomavirusi	• dva odmerka: 6. razred OŠ (0,6)	• 9-14 let: 2 odmerka (0,6) • 15 let ali več: 3 odmerki (0,2,6)	• cepljenje v breme OZZ pripada vsem dekletom in fantom do dopolnjenega 26. leta starosti

* **Zamudniki** so vse osebe, ki niso bile cepljene v časovnih okvirjih, opredeljenih s strani programa cepljenja; **cepljenje pri njih se opravi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)**

** Otroci, ki bodo v šolskem letu 2026/27 obiskovali 2. razred in so bili cepljeni s 6-valentnim cepivom (rojeni od oktobra 2019 dalje), bodo prejeli 4-komponentno cepivo Di/Te/Per-Polio

[#] Osebam pripadajo trije odmerki cepiva v breme OZZ (osnovna shema ali poživitveni odmerki)

[##] Za zamudnice in zamudnike bo cepljenje proti KME na voljo v breme OZZ dokler ne dopolnijo 26. let.

[$] Za osebe z zdravstvenimi ali epidemiološkimi indikacijami so priporočila dostopna na spletni strani: https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/ in https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/

[$$] Za otroke rojene od februarja 2024; otroci rojeni pred februarjem 2024 so cepljeni proti OMR (drugi odmerek prejmejo v starosti 5-6 let)

Tabela 2: Zaščita s protitelesi za predšolske otroke

ZAŠČITA PROTI OKUŽBAM	SHEMA ZAŠČITE S PROTITELESI
Respiratorni sincicijski virus (RSV)	• 1 odmerek dolgodelujočih monoklonskih protiteles proti RSV za otroke do 6. meseca starosti*

* Dojenčki, rojeni med sezono RSV, bodo zaščito prejeli pred odpustom iz porodnišnice, dojenčki, rojeni izven RSV sezone pa pri izbranem pediatru pred začetkom njihove prve sezone RSV

*Tabela 3: Cepljenje odraslih - redna cepljenja in zamudniki**

CEPLJENJE PROTI (CEPIVO)	SHEMA CEPLJENJA	FINANCIRANJE
Davica, tetanus (Di/Te)	• poživitveni odmerek Di/Te na 10 let	• v breme OZZ
Davica, tetanus, oslovski kašelj (Di/Te/Per)	• nosečnice po 24 tednu nosečnosti (en odmerek; v vsaki nosečnosti); • za ostale odrasle se priporoča enkrat v odrasli dobi (namesto Di/Te)	• nosečnice v breme OZZ; • ostali samoplačniško
Klopni meningoencefalitis (KME)#	• 3 odmerki (drugi odmerek 1-3 mesece ali 14 dni (hitra shema) po prvem, tretji odmerek 5-12 mesecev po drugem odmerku) • prvi poživitveni odmerek po 3 letih, nato vsakih 5 let; po 60. letu starosti na tri leta	• v breme OZZ za osebe, ki v tekočem letu dopolnijo 43, 44 ali 45 let oziroma za zamudnike (v letu 2026 so do cepljenja v breme OZZ upravičene osebe, rojene od 1970 do 1983)# • ostali samoplačniško
Pnevmokokne okužbe (20–valentno cepivo)	• cepljenje z enim odmerkom PCV20	• v breme OZZ za skupine z visokim tveganjem##, kronične bolnike in osebe stare ≥65 let
Respiratorni sincicijski virus (RSV)	• nosečnice od 24. do vključno 36. tedna nosečnosti (en odmerek)	• v breme OZZ

* Za osebe z zdravstvenimi ali epidemiološkimi indikacijami so priporočila (vključno s financiranjem) dostopna na spletni strani: https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/ in https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/

Osebam pripadajo trije odmerki cepiva v breme OZZ (osnovna shema ali poživitveni odmerki)

Osebe z okrnjeno imunostjo, anatomsko ali funkcionalno asplenijo, likvor fistulo ali polževim vsadkom

Vsem osebam, starejšim od 6 mesecev, pripada tudi brezplačno **sezonsko cepljenje proti gripi.** Priporočila za cepljenje proti **covidu-19** so na voljo na naslednji povezavi: https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/

Več informacij je na voljo v Programu cepljenja in Navodilih za izvajanje programa cepljenja (https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/program-cepljenja-in-zascite-z-zdravili/), Navodilih in priporočilih za posamezna cepljenja ter v Priporočilih za uporabo kombiniranih cepiv pri otrocih »zamudnikih« (https://nijz.si/nalezljive-bolezni/cepljenje/navodila-in-priporocila-za-cepljenje/).