

Priporočila za uporabo kombiniranih cepiv pri otrocih »zamudnikih«

V Sloveniji imamo za cepljenje otrok proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, okužbi s Hib in hepatitisu B na voljo naslednja kombinirana cepiva, ki so registrirana, kakor je navedeno (povzeto iz SmPC):

- **Hexyon** (šestvalentno cepivo)
 - za osnovno in obnovitveno cepljenje dojenčkov in malčkov starejših od 6 tednov proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, hepatitisu B in boleznim, ki jih povzroča *Haemophilus influenzae* tipa b
- **Adacel Polio** (di/Te/per/IPV)
 - za obnovitveno cepljenje oseb, starejših od 3 let, proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju in otroški paralizi;
- **Adacel** (di/Te/per)
 - za obnovitveno cepljenje oseb, starejših od 4 let, proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju;
- **diTeBooster** (di/Te)
 - za cepljenje proti davici in tetanusu oseb, starejših od 5 let.

Pri otrocih »zamudnikih« starejših od enega leta (s cepljenjem pričnejo ali nadaljujejo kasneje kot predpisuje Program), upoštevamo sledeče:

- Pri otrocih »zamudnikih«, **mlajših od 5 let, uporabimo šestvalentno cepivo** in jih cepimo po shemi 2+1 (drugi odmerek naj prejmejo najmanj osem tednov po prvem odmerku in tretji odmerek najmanj 6 mesecev po drugem odmerku) oziroma dodamo manjkajoče odmerke **šestvalentnega cepiva**.

Otroci, ki so že pričeli s cepljenjem proti hepatitisu B z monovalentnim cepivom in so zamudniki za cepljenje s šestvalentnim cepivom (npr. otroci, ki prihajajo iz drugih držav), naj pričnejo/nadaljujejo s cepljenjem s šestvalentnim cepivom po običajni shemi (2+1).

- Pri otrocih »zamudnikih«, **starih 5 let in starejših**, uporabimo cepivo **di/Te + IPV[#]** (za 1. in 2. odmerek) in praviloma **di/Te/per/IPV** (za 3. odmerek) in cepimo po shemi 2+1 (0,1,6) oziroma dodamo manjkajoče odmerke (tudi manjkajoče odmerke cepiva proti hepatitisu B).

Pri otrocih (tudi dojenčkih), ki ne smejo biti cepljeni proti oslovskemu kašlju, uporabimo cepivo di/Te (+ IPV[#] + Hib[&] + hep B) in jih cepimo po shemi 2+1.

Inaktivirana cepiva lahko dajemo sočasno ali v kakršnem koli razmiku do drugih živih ali mrtvih cepiv.

[#] IPV - inaktivirano cepivo proti otroški paralizi;

[&] Hib - cepivo proti hemofilusu influence tipa b; po enem letu starosti (do 5. leta) zadostuje en odmerek