

Evidenca obravnave uporabnikov drog

v letu obravnave 2025

Prvi in ponovni vstopi v obravnavo

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje



Ljubljana, 2026

Poročilo izdelali:

Nacionalni inštitut za javno zdravje:

Nataša Delfar, Zdravstveno podatkovni center

Mateja Jandl, Center za proučevanje in razvoj zdravja

David Breznikar, Zdravstveno podatkovni center

Tina Zupanec, Zdravstveno podatkovni center

Za vsebino poročila so odgovorni avtorji poročila.

Tekst ni lektoriran.

Spletni naslov Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/

Spletni naslov poročila: https://nijz.si/publikacije/evidenca-obravnave-uporabnikov-drog-v-letu-obravnave-2025-prvi-in-ponovni-vstopi-v-obravnavo/


Kontaktni naslovi:

natasa.delfar@nijz.si

mateja.jandl@nijz.si


V letu obravnave 2025 je poročalo 16 Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD) in 1 zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ). Skupno število uporabnikov prepovedanih drog, ki so bili v obravnavi je 198.

Slika 1: Število uporabnikov prepovedanih drog po Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025


Slika 2: Oseba ali inštitucija, ki je imela poglavitni vpliv, da se je uporabnik drog vključil v obravnavo (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

63.1% uporabnikov prepovedanih drog je samih poiskalo pomoč in vstopilo v program zdravljenja. 10.1% uporabnikov je napotil v program zdravljenja zavod za prestajanje kazni, 6.6% uporabnikov je napotili v program zdravljenja drug center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.


Slika 3: Predhodna obravnava zaradi uporabe drog v kateremkoli programu in kadarkoli v življenju (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

68.2% uporabnikov prepovedanih drog je že bilo vključenih v obravnavo zaradi uporabe droge. To so uporabniki, ki so ponovno vstopili v obravnavo. 28.3% uporabnikov je prvič vstopilo v obravnavo zdravljenja zaradi uporabe prepovedane droge.


Slika 4: Vrsta programa predhodne obravnave (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki, ki so že bili obravnavani v kateremkoli programu je 74.8% bilo obravnavanih v Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD). Pri tem vprašanju je bila možnost izbrati več odgovorov.


Slika 5: Povprečna starost uporabnika po spolu (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Moški, ki so bili v obravnavi so bili v povprečju stari 39.46 let, medtem ko je bila povprečna starost žensk 36.25 let. Skupna povprečna starost uporabnikov prepovedanih drog je bila 38.64 let.


Slika 6: Spol uporabnika prepovedanih drog po obravnavi (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

V letu 2025 je bilo v obravnavi 74.9% moških in 25.1% žensk. V program zdravljenja je prvič vstopilo 71.4% moških in 28.6% žensk. V ponovno obravnavo je vstopilo 76.3% moških in 23,7% žensk.


Slika 7: Zaposlitveni status uporabnika drog v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

V zadnjih 30 dneh, predno so uporabniki vstopili v program zdravljenja, je bilo 47.5% brezposelnih, 21.7% redno zaposlenih, 8.6% občasno zaposlenih.


Slika 8: Status bivanja v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

75.8% uporabnikov je imelo stalno namestitev pred vstopom v program zdravljenja, 12.1% je imelo nestalno namestitev, 8.1% uporabnikov prepovedanih drog je bilo v priporu/zaporu.


Slika 9: Ali je zadnjih 30 dni pred vstopom v program živel z odvisnikom od prepovedanih drog (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Odvisnik od prepovedanih drog je mišljena oseba, ki je bila kadarkoli odvisna od prepovedanih drog, ne glede na to, ali ta oseba uporablja droge ali pa je ozdravljena. 74.2% uporabnikov ni živelo, zadnjih 30 dni pred vstopom v program zdravljenja, z odvisnikom od prepovedanih drog.


Slika 10: Uporaba glavne droge v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

47.5% uporabnikov prepovedanih drog je navedlo, da je heroin glavna droga, ki jim je povzročala največ težav v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja. Sledi kokain (17.7%), kanabis (10.1%).


Slika 11: Način uporabe glavne droge v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Najpogostejši način s katerim je uporabnik uporabljal glavno drogo v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja, je bilo kajenje/inhaliranje (29.8%), njuhanje (27.8%), jedel/pil (23.2%) injiciranje/vbrizgavanje (17.2%).


Slika 12: Pogostost uporabe glavne droge v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

52.0% uporabnikov prepovedanih drog je navedlo, da je uporabljalo drogo vsak dan v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja.


Slika 13: Trajanje redne uporabe glavne droge v letih - razredi (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

49.0% uporabnikov je glavno drogo redno uporabljalo manj kot 10 let, 8.1% uporabnikov je glavo drogo redno uporabljalo 10 let, 21.2% uporabnikov je glavno drogo redno uporabljalo več kot 10 let. Pri 20.7% uporabnikov ni znano trajanje redne uporabe glavne droge.


Slika 14: Uporaba prve dodatne droge v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Dodatne droge so tiste droge, ki poleg glavne droge povzročajo nove ali dodatne težave pri uporabniku. 49.0% uporabnikov prepovedanih drog je navedlo, da niso uporabljali prvo dodatno drogo. 18.2% uporabnikov je uporabljalo kokain kot prvo dodatno drogo, 9.1% uporabnikov je uporabljalo kanabis kot prvo dodatno drogo.


Slika 15: Način uporabe prve dodatne droge v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so vstopili prvič ali ponovno v program zdravljenja, je bil najpogostejši način uporabe prve dodatne droge v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja, jedel/pil (16.2%), njuhanje (15.2%), sledilo je, kajenje/inhaliranje (10.1%) in injiciranje/vbrizgavanje (9.1%).


Slika 16: Pogostost uporabe prve dodatne droge v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so vstopili prvič ali ponovno v program zdravljenja, je 12.6% uporabnikov uporabljalo prvo dodatno drogo enkrat tedensko ali manj. 12.1% uporabnikov je uporabljalo prvo dodatno drogo vsak dan, 9.6% je uporabljalo 2 do 3 dni v tednu in 7.1% uporabnikov prepovedanih drog je uporabljalo prvo dodatno drogo 4 do 6 dni v tednu. 9.1% uporabnikov ni uporabljalo prvo dodatno drogo v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja.


Slika 17: Ali si je drogo kdajkoli injiciral? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

43.9% uporabnikov prepovedanih drog je navedlo, da niso nikoli injicirali droge, 26.3% uporabnikov prepovedanih drog je injiciralo drogo, vendar ne v zadnjih 12 mesecih. 6.6% uporabnikov je injiciralo drogo v zadnjih 30 dneh vsaj enkrat na dan.


Slika 18: Souporaba igle in/ali brizge, ki jo je pred tem že uporabil nekdo drug (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so si kdajkoli injicirali drogo, je 54.0% navedlo, da nikoli niso souporabili iglo in/ali brizgo, ki jo je pred tem že uporabil nekdo drug. 24.1% uporabnikov je souporabljalo iglo in/ali brizgo, vendar ne v zadnjih 12 mesecih. Za 11.5% uporabnikov prepovedanih drog ni znano ali so souporabili iglo in/ali brizgo, ki jo pred tem že uporabil nekdo drug.


Slika 19: Mesto nakupa/prejetja največ sterilnih igel in brizg v zadnjih 30 dneh pred tokratnim vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so prejeli/kupili sterilne igle in brizge v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja, je 68.8% uporabnikov navedlo, da so prejeli/kupili sterilne igle in brizge v lekarni in 18.8% uporabnikov je prejelo sterilne igle in brizge v nizkopražnem programu.


Slika 20: Ali je pri zadnjem spolnem odnosu uporabil kondom? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so že imeli spolne odnose, je 50.8% povedalo, da pri zadnjem spolnem odnosu niso uporabili kondom. 25.0% uporabnikov je navedlo, da so pri zadnjem spolnem odnosu uporabili kondom.


Slika 21: Ali je popolnoma cepljen proti hepatitisu B(HBV)? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025


47.0% uporabnikov prepovedanih drog je bilo popolno cepljenih proti hepatitisu B (HBV), kar pomeni, da so prejeli 3 odmerke cepiva proti HBV skladno z navodili. 15.2% uporabnikov ni bilo nikoli cepljenih proti HBV. 4.5% uporabnikov je bilo nepopolno cepljenih proti HBV. Pri 30.8% uporabnikih ni znano ali so bili cepljeni ali ne proti HBV.

Slika 22: Testiranje za HBV, HCV, in HIV pred povpraševanjem po zdravljenju (podatki iz dokumentacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog) (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025


Slika 23: Leto predhodne obravnave (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

31.9% uporabnikov, ki so že bili obravnavani v kateremkoli programu zdravljenja, je bilo obravnavanih zadnjič v letu 2025 in 25.9% v letu 2024.


Slika 24: Uporabnik drog trenutno drugje v obravnavi (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Večina uporabnikov prepovedanih drog ni bila trenutno drugje v obravnavi zdravljenja.


Slika 25: Spol uporabnika prepovedanih drog (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

V obravnavi zdravljenja je bilo 74.2% moških in 25.8% žensk.


Slika 26: Povprečna starost uporabnika po spolu pri prvem vstopu v zdravljenje (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Moški, ki so prvič vstopili v obravnavo, so bili v povprečju stari 34.18 let, medtem ko je bila povprečna starost žensk 31.88 let. Skupna povprečna starost uporabnikov, ki so prvič vstopili v program zdravljenja, je bila 33.52 let.


Slika 27: Povprečna starost uporabnika po spolu pri ponovnem vstopu v zdravljenje (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025


Moški, ki so ponovno vstopili v obravnavo, so bili v povprečju stari 41.43 let, medtem ko je bila povprečna starost žensk 38.41 let. Skupna povprečna starost uporabnikov, ki so ponovno vstopili v program zdravljenja, je bila 40.71 let.

Slika 28: Državljanstvo (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025


Slika 29: Najvišja dosežena stopnja izobrazbe uporabnika drog (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

54.0% uporabnikov prepovedanih drog je pridobilo poklicno ali srednješolsko izobrazbo, 32.3% osnovnošolsko izobrazbo, 4.0% nepopolno osnovnošolsko izobrazbo, 8.1% višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.


Slika 30: Občina prebivališča zadnjih 30 dni pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Največ uporabnikov prepovedanih drog je imelo, v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja, občino bivanja v Mariboru in Ljubljani. Občina bivanja se nanaša na to v kateri občini je uporabnik prebival v zadnjih 30 dneh, ne glede na to, ali je imel tam prijavljeno stalno prebivališče ali ne.


Slika 31: S kom je živel zadnjih 30 dni pred vstopom v program (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Oblika bivanja/gospodinjstva zadnjih 30 dni pred vstopom v program zdravljenja je bila sledeča: 75.8% uporabnikov je živelo samih, 11.6% je živelo s primarno družino, 11.6% uporabnikov je navedlo zapor, 0.5% uporabnikov je živelo s partnerjem/ otroki.


Slika 32: Ali ima otroke oz. ali živi z njimi (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

63.6% uporabnikov prepovedanih drog nima otrok in ne živi z otroki. 17.2% ima otroke, a ne živi z njimi, 14.1% uporabnikov ima otroke in živi z otroki.

Slika 33: Povprečna starost uporabnikov ob prvi uporabi glavne droge po spolu in predhodni obravnavi (povprečje)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Uporabniki prepovedanih drog, ki so prvič vstopili v obravnavo zdravljenja, so bili pri prvi uporabi glavne droge v povprečju stari 21.79 let. Moški so bili pri prvi uporabe glavne droge povprečno stari 22.39 let, medtem ko so bile ženske povprečno stare 19.71 let.

Uporabniki prepovedanih drog, ki so ponovno vstopili v obravnavo zdravljenja, so bili pri prvi uporabi glavne droge v povprečju stari 22.47 let. Moški so bili pri prvi uporabe glavne droge povprečno stari 22.89 let, medtem ko so bile ženske povprečno stare 21.15 let.


Slika 34: Povprečna starost uporabnikov ob prvi uporabi prve dodatne droge po spolu (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Moški, ki so prvič uporabili prvo dodatno drogo so bili povprečno stari 22.29 let, medtem ko so bile ženske povprečno stare 20.29 let. V povprečju so bili uporabniki, ki so prvič uporabili prvo dodatno drogo stari 21.74 let.

Slika 35: Povprečna starost uporabnikov ob prvi uporabi prve dodatne droge po predhodni obravnavi (povprečje)




Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Uporabniki prepovedanih drog, ki so prvič vstopili v program zdravljenja, so bili ob prvi uporabi prve dodatne droge v povprečju stari 23.43 let. Uporabniki, ki so ponovno vstopili v program zdravljenja, so bili ob prvi uporabi

prve dodatne droge v povprečju stari 21.06 let. Povprečno so bili uporabniki ob prvi uporabi prve dodatne droge stari 21.70 let.


Slika 36: Trajanje redne uporabe prve dodatne droge v letih (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

46.5% uporabnikov je navedlo, da so prvo dodatno drogo uporabljali manj kot 10 let.


Slika 37: Starost ob prvi uporabi katerekoli prepovedane droge (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

V povprečju so bili uporabniki prepovedanih drog, ob prvi uporabi katerekoli prepovedane droge, stari 18.53 let. Moški so bili povprečno stari 18.37 let, medtem ko so bile ženske povprečno stare 18.98 let.


Slika 38: Vrsta prepovedane droge ob prvi uporabi (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

54.0% uporabnikov prepovedanih drog je povedalo, da je bila prepovedana droga, katero so prvič uporabili kanabis. 22.7% uporabnikov je navedlo heroin kot prepovedano drogo, ki so jo prvič uporabili.


Slika 39: Kriteriji za razvrščanje dodatnih drog (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025


Kriteriji za razvrščanje dodatnih drog je bila predvsem klinična pomembnost 69.2%.

Slika 40: Ali je bilo težko določiti, katera je bila glavna droga v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025


Slika 41: Vključitev v program nadomestnega zdravljenja z opioidi (metadon, buprenorfin, buprenorfin/naloxon, SR-morfin) (NZO) (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

84.3% uporabnikov prepovedanih drog je že bilo vključenih v program nadomestnega zdravljenja z opioidi (buprenorfin, buprenorfin/naloxon, SR-morfin) (NZO).


Slika 42: Starost ob prvi vključitvi v program nadomestnega zdravljenja z opioidi (metadon, buprenorfin, buprenorfin/naloxon, SR-morfin) (NZO) (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

V povprečju so bili uporabniki prepovedanih drog, ob prvi vključitvi v program nadomestnega zdravljenja z opioidi, stari 26 let. Moški so bili povprečno stari 26.16 let, medtem ko so bile ženske povprečno stare 24.65 let.


Slika 43: Starost ob prvem injiciranju (povprečje)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so si kdajkoli injicirali drogo, so bili v povprečju stari 23.15 let. Moški so bili povprečno stari 23.22 let, medtem ko so bile ženske povprečno stare 22.89 let.


Slika 44: Souporaba igle in/ali brizge ob zadnjem injiciranju (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so si kdajkoli injicirali drogo, je 74.1% navedlo, da niso souporabili igle in/ali brizge ob zadnjem injiciranju.


Slika 45: Souporaba ostalega pribora za injiciranje drog (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so si kdajkoli injicirali drogo, je 52.9% uporabnikov navedlo, da nikoli niso souporabili ostalega pripora za injiciranje drog. 21.8% uporabnikov prepovedanih drog je souporabljalo ostali pribor za injiciranje drog, vendar ne v zadnjih 12 mesecih.


Slika 46: Souporaba ostalega pribora za injiciranje ob zadnjem injiciranju (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so si kdajkoli injicirali drogo, je 82.6% navedlo, da niso souporabili ostalega pribora za injiciranje ob zadnjem injiciranju.


Slika 47: Ali je prejel/kupil sterilne igle in brizge v zadnjih 30 dneh pred tokratnim vstopom v program? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so si kdajkoli injicirali drogo, je 57.5% navedlo, da niso prejeli/kupili sterilne igle in brizge v zadnjih 30 dneh pred tokratnim vstopom v program zdravljenja. 16.1% uporabnikov je prejelo/kupilo manj kot 28 igel in brizg v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja. Za 14.9% uporabnikov prepovednih drog ni znano ali so kupili/prejeli sterilne igle in brizge v zadnjih 30 dneh pred vstopom v program zdravljenja.


Slika 48: Ali je že imel spolne odnose? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Največ uporabnikov prepovedanih drog (30.8%) je povedalo, da so imeli spolni odnos v zadnjih 30 dneh. 14.6% uporabnikov je imelo spolne odnose v zadnjih 12 mesecih, vendar ne v zadnjih 30 dneh. 19.2% uporabnikov je imelo spolni odnos, vendar ne v zadnjih 12 mesecih. Za 10.1% uporabnikov ni znano ali so že imeli spolni odnos. 25.3% uporabnikov prepovedanih drog ni želelo odgovoriti ali so že imeli spolni odnos.


Slika 49: Ali je imel v zadnjih 12 mesecih stalnega spolnega partnerja? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so že imeli spolni odnos, je 49.2% navedlo, da so imeli v zadnjih 12 mesecih stalnega spolnega partnerja. 35.2% uporabnikov je povedalo, da v zadnjih 12 mesecih niso imeli stalnega spolnega partnerja.


Slika 50: Število vseh spolnih partnerjev v zadnjih 12 mesecih (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so že imeli spolni odnos, je 56.3% navedlo, da so imeli enega spolnega partnerja v zadnjih 12 mesecih. 10.7% uporabnikov je odgovorilo, da so imeli od dva do štiri spolne partnerje v zadnjih 12 mesecih.


Slika 51: Ali je kdajkoli prejel plačilo za spolne odnose? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Med uporabniki prepovedanih drog, ki so že imeli spolne odnose, je 82.0% povedalo, da nikoli niso prejeli plačila za spolne odnose.


Slika 52: Testiranje za HIV pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

34.3% uporabnikov prepovedanih drog je bilo testiranih za HIV, vendar ne v zadnjih 12 mesecih. 24.2% uporabnikov prepovedanih drog je bilo testiranih za HIV v zadnjih 12 mesecih in vedo rezultat testiranja, ki je bil negativen. 14.1% uporabnikov ni bilo nikoli testiranih za HIV.


Slika 53: Testiranje za HCV pred vstopom v program zdravljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

33.8% uporabnikov prepovedanih drog je bilo testiranih za HCV pred vstopom v program zdravljenja, vendar ne v zadnjih 12 mesecih. 13.6% uporabnikov ni bilo nikoli testiranih za HCV. 17.2% uporabnikov je bilo testiranih za HCV v zadnjih 12 mesecih in vedo rezultat testiranja, ki je bil negativen.


Slika 54: Testiranje za HBV pred vstopom v program zdravljenje (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

32.3% uporabnikov prepovedanih drog je bilo testiranih za HBV pred vstopom v program zdravljenja, vendar ne v zadnjih 12 mesecih. 14.6% uporabnikov ni bilo nikoli testiranih za HBV. 23.7% uporabnikov prepovedanih drog je bilo testiranih za HBV v zadnjih 12 mesecih in vedo rezultat testiranja, ki je bil negativen.


Slika 55: Ali se zdravi oziroma se je zdravil za katero izmed navedenih nalezljivih bolezni? (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

Večina uporabnikov prepovedanih drog se ni zdravilo zaradi tuberkuloze, hepatitisa A, hepatitisa B, hepatitisa C in HIV-a/AIDS-a.


Slika 56: Obravnava s strani policije, na sodišču (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

29.8% uporabnikov prepovedanih drog je že bilo obravnavanih na sodišču zaradi problemov, ki so bili povezani z drogo. 39.9% uporabnikov je že bilo obravnavanih s strani policije, kar pomeni, da so bili pridržani zaradi prekrška ali kaznivega dejanja povezanega z drogami.

Slika 57: Obravnava v zavodu za prestajanje kazni zapora, odvzem vozniškega dovoljenja (%)



Vir: Evidenca obravnave uporabnikov drog (TDI), NIJZ 2025

26.3% uporabnikom prepovedanih drog je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom drog. 18.2% uporabnikov je bilo obravnavanih v zavodu za prestajanje kazni zapora zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami.